

PARTIE I

Q1 a) Les racines complexes de l'équation  $z^r = 1$  sont les racines  $r$ -ièmes de l'unité, c'est à dire  $z_0, z_1, \dots, z_{r-1}$  avec  $z_k = e^{i k \frac{2\pi}{r}}$  pour tout  $k \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket$

Notons que:  $\forall k \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket, z_k = (e^{i \frac{2\pi}{r}})^k = \omega_r^k$ .

Pour conséquent les racines complexes de l'équation  $z^r = 1$  sont:  $1, \omega_r, \omega_r^2, \omega_r^3, \dots, \omega_r^{r-1}$

b)  $S_r(x) = \sum_{k=0}^{r-1} \omega_r^{kx} = \sum_{k=0}^{r-1} (\omega_r^x)^k$

1<sup>re</sup> cas:  $\omega_r^x = 1$ ;  $S_r(x) = r$  ( $\forall k \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket, (\omega_r^x)^k = 1$ )

2<sup>de</sup> cas:  $\omega_r^x \neq 1$ .  $S_r(x) = \frac{1 - (\omega_r^x)^r}{1 - \omega_r^x} = \frac{1 - ((\omega_r)^r)^x}{1 - \omega_r^x} = 0$  car  $(\omega_r)^r = 1$ .

Notons que:  $\omega_r^x = 1 \Leftrightarrow (e^{i \frac{2\pi}{r}})^x = 1 \Leftrightarrow e^{i \frac{2\pi x}{r}} = 1 \Leftrightarrow \frac{2\pi x}{r} \equiv 0 \pmod{2\pi}$

$\omega_r^x = 1 \Leftrightarrow \frac{x}{r} \equiv 0 \pmod{1} \Leftrightarrow x \equiv 0 \pmod{r} \Leftrightarrow x$  est multiple de  $r$ .

Résumons. Si  $x$  est multiple de  $r$ :  $S_r(x) = r$ ;

si  $x$  n'est pas multiple de  $r$ :  $S_r(x) = 0$

$t_r(x, y) = \sum_{k=0}^{r-1} \omega_r^{-xk} \omega_r^{ky} = \sum_{k=0}^{r-1} \omega_r^{k(y-x)} = S_r(y-x)$ .

Donc si  $y-x$  est un multiple de  $r$ :  $t_r(x, y) = r$ ;

si  $y-x$  n'est pas un multiple de  $r$ :  $t_r(x, y) = 0$ .

Q2 a)  $\pi_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega_4 & \omega_4^2 & \omega_4^3 \\ 1 & \omega_4^2 & \omega_4^{2 \cdot 2} & \omega_4^{2 \cdot 3} \\ 1 & \omega_4^3 & \omega_4^{3 \cdot 2} & \omega_4^{3 \cdot 3} \end{bmatrix}$

$\omega_4 = e^{i \frac{2\pi}{4}} = e^{i \frac{\pi}{2}} = i$   
 $\omega_4^2 = -1, \omega_4^3 = -i, \omega_4^4 = 1$

Donc  $\pi_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{bmatrix}$

$\overline{\pi_4} \pi_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$   $\overline{\pi_4} \pi_4 = 4 I_4$ .

Remarque.. Cette égalité donne  $(\frac{1}{r} \bar{\pi}_r) \pi_r = I_r$  ce qui prouve que  $\pi_r$  est inversible et que  $\pi_r^{-1} = \frac{1}{r} \bar{\pi}_r$ . Généralisons...

On montrera que  $\omega_r^{(x-1)(y-1)}$  est l'élément de  $\pi_r$  situé à l'intersection de la  $x$  ième ligne et de la  $y$  ième colonne et ceci pour tout  $(x, y) \in \llbracket 1, r \rrbracket^2$ .

Soit  $(x, y) \in \llbracket 1, r \rrbracket^2$ . Notons  $a_{xy}$  l'élément de  $\bar{\pi}_r \pi_r$  situé à l'intersection de la  $x$  ième ligne et de la  $y$  ième colonne. Notons aussi que :  $\bar{\omega}_r = \frac{1}{\omega_r} = \omega_r^{-1}$  car  $|\omega_r| = 1$ .

$$a_{xy} = \sum_{k=1}^r \omega_r^{-(x-1)(k-1)} \omega_r^{(k-1)(y-1)} \stackrel{k \rightarrow k+1}{=} \sum_{k=0}^{r-1} \omega_r^{-(x-1)k} \omega_r^{k(y-1)} = t_r(x-1, y-1)$$

Soit  $a_{xy} = 0$  si  $(y-1)-(x-1)$  n'est pas un multiple de  $r$ .

$a_{xy} = r$  si  $(y-1)-(x-1)$  est un multiple de  $r$ .

$$y-1-(x-1) = y-x. \text{ Or } x \in \llbracket 1, r \rrbracket \text{ et } y \in \llbracket 1, r \rrbracket \text{ donc } x-y \in \llbracket -(r-1), r-1 \rrbracket$$

Pour conclure  $y-x$  est un multiple de  $r$  si  $y-x=0$  (c'est le seul multiple de  $r$  dans l'intervalle  $\llbracket -(r-1), r-1 \rrbracket$ ).

$$\text{Soit } a_{xy} = \begin{cases} 0 & \text{si } x \neq y \\ r & \text{si } x = y \end{cases}$$

Pour conclure  $\bar{\pi}_r \pi_r = r I_r$  où  $I_r$  est la matrice identité d'ordre  $r$ .

$$\underline{\underline{\bar{\pi}_r \pi_r = r I_r}}$$

Soit  $(\frac{1}{r} \bar{\pi}_r) \pi_r = I_r$ .  $\pi_r$  est donc inversible et  $\pi_r^{-1} = \frac{1}{r} \bar{\pi}_r$

$$\text{c) Posons } U = \begin{bmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_{r-1} \end{bmatrix} \text{ et } V = \pi_r U. \text{ Supposons que } V = \begin{bmatrix} v_0 \\ v_1 \\ \vdots \\ v_{r-1} \end{bmatrix}$$

Soit  $n \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket$ ,  $v_n$  n'est autre que le produit de la  $n+1$  ième ligne de  $\pi_r$  avec  $U$ .

$$\text{Par conséquent } v_n = [1 \ \omega_r^n \ \omega_r^{2n} \ \dots \ \omega_r^{n(r-1)}] \begin{bmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_{r-1} \end{bmatrix}$$

Soit  $v_n = \lambda_0 + \lambda_1 \omega_r^n + \lambda_2 \omega_r^{2n} + \dots + \lambda_{r-1} \omega_r^{(r-1)n} = 0$  par hypothèse

Soit  $V=0$ . ce qui signifie que  $\pi_r U=0$ . L'inversibilité de  $\pi_r$  donne alors  $U=0$

$U=0$  signifie alors que :  $\lambda_0 = \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{r-1} = 0$ . c'est ce qu'il fallait montrer.

d) montrons donc que la famille  $(e_0, e_1, \dots, e_{r-1})$  est libre.

Soit  $(\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{r-1}) \in \mathbb{C}^r$  tel que  $\lambda_0 e_0 + \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_{r-1} e_{r-1} = 0$ .

Alors  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\lambda_0 p^n + \lambda_1 p^n \omega_p^n + \dots + \lambda_{r-1} p^n \omega_p^{(r-1)n} = 0$ .

Donc  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\lambda_0 + \lambda_1 \omega_p^n + \lambda_2 \omega_p^{2n} + \dots + \lambda_{r-1} \omega_p^{(r-1)n} = 0$  car  $p \in ]0, 1[$ .

En particulier  $\forall n \in ]0, r-1[$ ,  $\lambda_0 + \lambda_1 \omega_p^n + \lambda_2 \omega_p^{2n} + \dots + \lambda_{r-1} \omega_p^{(r-1)n} = 0$ . Ce qui prouve de suite alors que :  $\lambda_0 = \lambda_1 = \dots = \lambda_{r-1} = 0$  et achève de prouver que les suites  $e_0, e_1, \dots, e_{r-1}$  sont linéairement indépendantes.

La famille  $(e_0, e_1, \dots, e_{r-1})$  est libre dans  $S$ .

pour tout  $n \in ]r-1, +\infty[$

ⓐ) Montrons que l'ensemble  $E$  des suites de  $S$  vérifiant (1) est un sous-espace de  $S$ .

-  $E \neq \emptyset$  car la suite nulle de  $S$  vérifie (1) pour tout  $n \in ]r-1, +\infty[$ .

- Soient  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$ ,  $\hat{u} = (\hat{u}_n)$  et  $\hat{w} = (\hat{w}_n)$  deux éléments de  $E$ .

Montrons que  $\alpha \hat{u} + \beta \hat{w} = (\alpha \hat{u}_n + \beta \hat{w}_n)$  appartient à  $E$  c'est à dire vérifie (1) pour tout  $n \in ]r-1, +\infty[$ . Soit  $n$  un élément de  $]r-1, +\infty[$

$$(\alpha \hat{u}_n + \beta \hat{w}_n) + p(\alpha \hat{u}_{n-1} + \beta \hat{w}_{n-1}) + p^2(\alpha \hat{u}_{n-2} + \beta \hat{w}_{n-2}) + \dots + p^{r-1}(\alpha \hat{u}_{n-r+1} + \beta \hat{w}_{n-r+1}) = \alpha(\hat{u}_n + p\hat{u}_{n-1} + p^2\hat{u}_{n-2} + \dots + p^{r-1}\hat{u}_{n-r+1}) + \beta(\hat{w}_n + p\hat{w}_{n-1} + p^2\hat{w}_{n-2} + \dots + p^{r-1}\hat{w}_{n-r+1}) = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0$$

↑  
par  $\hat{u}$  vérifiant (1)

Ceci achève de prouver que  $E$  est un sous-espace vectoriel de  $S$ .

b) Il est triviale et à retenir.

La morale de l'histoire repose sur le fait qu'un élément  $v = (v_n)$  de  $E$  est entièrement déterminé par ses  $r-1$  premiers termes :  $v_0, v_1, \dots, v_{r-2}$ . L'isomorphisme entre  $E$  et  $\mathbb{C}^{r-1}$  apparaît alors de manière claire et donne à  $E$  la dimension de  $\mathbb{C}^{r-1}$  soit :  $r-1$ .

→ Linéarité de

Soient  $\lambda \in \mathbb{C}$ ,  $v = (v_n)$  et  $w = (w_n)$  deux éléments de  $E$ .

$$F(\lambda v + w) = F((\lambda v_n + w_n)) = (\lambda v_0 + w_0, \lambda v_1 + w_1, \dots, \lambda v_{r-2} + w_{r-2}) = \lambda(v_0, v_1, \dots, v_{r-2}) + (w_0, w_1, \dots, w_{r-2})$$

$F(\lambda v + w) = \lambda F(v) + F(w)$ ; c'est ce qu'il fallait montrer.

$F$  est une application linéaire de  $E$  dans  $\mathbb{C}^{r-1}$ .

- Injectivité de  $F$ .

Soit  $v = (v_n) \in \text{Ker } F$ .  $F(v) = 0_{\mathbb{C}^{r-1}}$  donc  $(v_0, v_1, \dots, v_{r-2}) = 0_{\mathbb{C}^{r-1}}$ ;  $v_0 = v_1 = \dots = v_{r-2} = 0$

raisonner à l'aide d'une récurrence d'ordre  $r-1$  que :  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $v_n = 0$ .

. Il semble que cela soit vrai pour  $n=0, n=1, \dots, n=r-2$ .

. Supposons alors la propriété vraie pour  $n, n+1, \dots, n+r-2$  et montrons la alors pour  $n+r-1$ . ( $n \in \mathbb{N}$ ).

$v_{n+r-1} + p v_{n+r-2} + p^2 v_{n+r-3} + \dots + p^{r-1} v_n = 0$  (relation (2) pour  $n+r-1$ ); et l'hypothèse de récurrence donne :  $v_n = v_{n+1} = v_{n+2} = \dots = v_{n+r-2} = 0$ ; donc  $v_{n+r-1} = 0$ .

ici achève la récurrence;  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $v_n = 0$ ;  $v = (v_n) = 0_{\mathbb{S}}$ .  $\text{Ker } F = \{0_{\mathbb{E}}\}$ .  $F$  est injective.

- Surjectivité de  $F$

Soit  $(a_0, a_1, \dots, a_{r-2}) \in \mathbb{C}^{r-1}$ . Montrons qu'il existe un élément  $v$  de  $\mathbb{E}$  tel que :  $F(v) = (a_0, \dots, a_{r-2})$

considérons la suite  $v = (v_n)$  définie par la récurrence d'ordre  $r-1$  suivante :

$$v_0 = a_0, v_1 = a_1, \dots, v_{r-2} = a_{r-2}$$

$$(0) \quad \text{et } \forall n \in \mathbb{Z}[r-1, +\infty[ , v_n = -p v_{n-1} - p^2 v_{n-2} - \dots - p^{r-1} v_{n-r+1}$$

cette suite  $v$  est entièrement définie car on se donne ses  $r-1$  premiers termes et le moyen d'obtenir un terme à partir des  $r-1$  précédents. Rappel la deuxième ligne de (0) montre que cette suite vérifie (2) pour tout  $n \in \mathbb{Z}[r-1, +\infty[$ , donc qu'elle appartient à  $\mathbb{E}$ . La première ligne de (0) prouve alors que :  $F(v) = (a_0, a_1, \dots, a_{r-2})$

Mais avant de conclure montrons que tout élément de  $\mathbb{C}^{r-1}$  possède un antécédant dans  $\mathbb{E}$  par  $F$ .

$F$  est surjective.

Pour finir  $F$  est linéaire et bijective de  $\mathbb{E}$  sur  $\mathbb{C}^{r-1}$ ; c'est donc un isomorphisme de  $\mathbb{E}$  sur  $\mathbb{C}^{r-1}$ . Et  $\mathbb{C}^{r-1}$  étant isomorphe, il est même dimensionnel.

à  $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^{r-1} = r-1$  donc  $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{E} = r-1$ .

⊂) Gagner du temps et commencer par la fin !

Soit  $v = (v_n)$  une suite géométrique d'élément de  $\mathbb{C}$  et de premier terme 1

et de raison  $\lambda$ .

1° Cas  $\lambda = 0$ . Alors  $v_0 = 1$ , et  $\forall n \in \mathbb{N}^* v_n = 0$ ;  $v$  ne satisfait (1) pour  $n = r-1$  par exemple ( $v_{r-1} + p v_{r-2} + p^2 v_{r-3} + \dots + p^{r-1} v_0 = p^{r-1} \neq 0$ )  
 donc  $v \notin E$ .

2° Cas  $\lambda \neq 0$ . Alors  $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \lambda^n$

$$v \in E \Leftrightarrow \forall n \in [r-1, r-1], 0 = v_n + p v_{n-1} + p^2 v_{n-2} + \dots + p^{r-1} v_{n-r+1} = \lambda^n + p \lambda^{n-1} + p^2 \lambda^{n-2} + \dots + p^{r-1} \lambda^{n-r+1}$$

$$v \in E \Leftrightarrow \forall n \in [r-1, r-1], 0 = \lambda^n [1 + (\frac{p}{\lambda}) + (\frac{p}{\lambda})^2 + \dots + (\frac{p}{\lambda})^{r-1}]$$

$$v \in E \Leftrightarrow 1 + \frac{p}{\lambda} + (\frac{p}{\lambda})^2 + \dots + (\frac{p}{\lambda})^{r-1} = 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{p}{\lambda} = 1 \text{ et } r=0 \text{ !!} \\ \frac{p}{\lambda} \neq 1 \text{ et } \frac{1 - (\frac{p}{\lambda})^r}{1 - \frac{p}{\lambda}} = 0 \end{array} \right.$$

$$v \in E \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} (\frac{p}{\lambda}) + 1 \text{ et} \\ (\frac{p}{\lambda})^r = 1 \end{array} \right.$$

$$v \in E \Leftrightarrow \frac{p}{\lambda} + 1 \text{ et } (\frac{p}{\lambda})^r = 1 \Leftrightarrow \exists k \in [1, r-1], \frac{p}{\lambda} = \omega_r^k \Leftrightarrow \exists k \in [1, r-1], \lambda = p \omega_r^k$$

OK! ↑ racine  $r$ -ième

$$v \in E \Leftrightarrow \exists k \in [1, r-1], \lambda = p \omega_r^k \Leftrightarrow \exists k \in [1, r-1], \forall n \in \mathbb{N}, v_n = p^n \omega_r^{kn}$$

Notons que pour tout  $k \in [1, r-1], e_k = (p^n \omega_r^{kn})$  est la suite géométrique de premier terme 1 et de raison  $\omega_r^k$ .

Par conséquent  $v \in E \Leftrightarrow v = e_1$  ou  $v = e_2$  ou ... ou  $v = e_{r-1}$

ceci a le bon goût de nous dire que

1°  $e_1 \in E, e_2 \in E, \dots, e_{r-1} \in E$

2°  $e_1, e_2, \dots, e_{r-1}$  sont les seules suites géométriques de premier terme égal à 1 dans  $E$

d)  $(e_1, e_2, \dots, e_{r-1})$  est une famille libre (\*) ( $\neq \emptyset$ ) de  $r-1$  éléments de  $E$  ( $\neq \emptyset$ ) et  $E$  est de dimension  $r-1$ . Par conséquent  $(e_1, e_2, \dots, e_{r-1})$  est une base de  $E$ .

Soit  $v = (v_n) \in E$ .

(\*) sous-famille d'une famille libre.

$v$  vérifie (1) pour tout  $n \in [r-1, r-1]$

$v \in E$

$$\exists (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{r-1}) \in \mathbb{C}^{r-1}, v = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_{r-1} e_{r-1}$$

$$\exists (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{r-1}) \in \mathbb{C}^{r-1}, \forall n \in \mathbb{N}, v_n = \lambda_1 p^n \omega_r^{kn} + \lambda_2 p^n \omega_r^{2kn} + \dots + \lambda_{r-1} p^n \omega_r^{(r-1)kn}$$

soit  $k \in \mathbb{I}, r-1 \mathbb{I}$ .  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\|F^n u_r^k\| = p^n \|u_r^k\|$  donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (p^n \|u_r^k\|) = 0$ .

ceci montre que pour tout  $k \in \mathbb{I}, r-1 \mathbb{I}$ , la suite  $e_k$  converge vers 0.

Toute suite de  $E$  étant combinaison linéaire de  $e_1, e_2, \dots, e_{r-1}$  : toute suite de  $E$  converge vers 0.

④ a) soit  $c = (c_n)$  une suite constante. soit  $\lambda$  l'élément de  $\mathbb{C}$  tel que :  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $c_n = \lambda$ .

$\Downarrow$   $c$  vérifie (1) pour tout  $n \in \mathbb{I}, r-1, +\infty \mathbb{I}$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \lambda + p\lambda + p^2\lambda + \dots + p^{r-1}\lambda = p^r$$

$$\Downarrow \lambda = \frac{p^r}{1+p+\dots+p^{r-1}} = \frac{p^r}{\frac{1-p^r}{1-p}} = \frac{p^r(1-p)}{1-p^r}$$

l'unique suite constante vérifiant (1) est :  $c = \left( \frac{p^r(1-p)}{1-p^r} \right) = (c_n)$ .

b)  $u$  vérifie (1) pour tout  $n \in \mathbb{I}, r-1, +\infty \mathbb{I}$

$\Downarrow$

$$\forall n \in \mathbb{I}, r-1, +\infty \mathbb{I}, u_n + pu_{n-1} + p^2u_{n-2} + \dots + p^{r-1}u_{n-r+1} = p^r$$

$\Downarrow$

$$\forall n \in \mathbb{I}, r-1, +\infty \mathbb{I}, u_n + pu_{n-1} + p^2u_{n-2} + \dots + p^{r-1}u_{n-r+1} = c_n + pc_{n-1} + p^2c_{n-2} + \dots + p^{r-1}c_{n-r+1}$$

$\Downarrow$

$$\forall n \in \mathbb{I}, r-1, +\infty \mathbb{I}, (u_n - c_n) + p(u_{n-1} - c_{n-1}) + p^2(u_{n-2} - c_{n-2}) + \dots + p^{r-1}(u_{n-r+1} - c_{n-r+1}) = 0$$

$\Downarrow$

$v = u - c$  vérifie (1) pour tout  $n \in \mathbb{I}, r-1, +\infty \mathbb{I}$ .

c) soit  $u$  une suite de  $S$  vérifiant (1).  $v = u - c$  vérifie (1) donc converge vers 0.

$u = v + c$ ,  $v$  converge vers 0 et  $c$  est une "valeur constante"  $\frac{p^r(1-p)}{1-p^r}$

donc  $u$  converge vers  $\frac{p^r(1-p)}{1-p^r}$ .

## PARTIE II

(Q1) a)  $S_1, S_2, \dots, S_r, S_{r+1}, \dots, S_{2r}, \dots, S_{r+(r-1)}, \dots, S_{rn}$  étai indépendants les événements  $E_1, E_2, \dots, E_n$  le patoune et ceà pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Par conséquent les événements  $\bar{E}_1, \bar{E}_2, \dots, \bar{E}_n$  sont également indépendants pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, P\left(\bigcap_{k=1}^n \bar{E}_k\right) = \prod_{k=1}^n P(\bar{E}_k) = \prod_{k=1}^n (1 - P(E_k)) = \prod_{k=1}^n (1 - p^r) = (1 - p^r)^n$$

$$\begin{cases} P(E_k) = P(S_{r(k-1)+1} \cap S_{r(k-1)+2} \cap \dots \cap S_{rk}) \\ P(E_k) = P(S_{r(k-1)+1}) P(S_{r(k-1)+2}) \dots P(S_{rk}) = p^r. \end{cases}$$

donc  $P\left(\bigcap_{k=1}^n \bar{E}_k\right) = (1 - p^r)^n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

$\left(\bigcap_{k=1}^n \bar{E}_k\right)$  est une suite décroissante d'événements. Le théorème de la limite nous donne même

$$\text{alors que: } \lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcap_{k=1}^n \bar{E}_k\right) = P\left(\bigcap_{n=1}^{+\infty} \left(\bigcap_{k=1}^n \bar{E}_k\right)\right) = P\left(\bigcap_{k=1}^{+\infty} \bar{E}_k\right)$$

$$\text{donc } P\left(\bigcap_{k=1}^{+\infty} \bar{E}_k\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - p^r)^n = 0 \text{ car } 1 - p^r \in ]0, 1[.$$

$$\text{Finalement } \underline{\underline{P\left(\bigcap_{k=1}^{+\infty} \bar{E}_k\right) = 0.}}$$

b) soit  $V$  l'événement : on obtient  $r$  succès consécutifs.

$$\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k \subset V \text{ donc } P\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k\right) \leq P(V).$$

$$\text{Or } P\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k\right) = 1 - P\left(\overline{\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k}\right) = 1 - P\left(\bigcap_{k=1}^{+\infty} \bar{E}_k\right) = 1 - 0 = 1.$$

$$\text{donc } 1 \leq P(V) \leq 1 \quad P(V) = 1.$$

l'obtention de  $r$  succès consécutifs et un événement réalisé avec une probabilité égale à 1, c'est un événement quasi-certain ... la suite nous montrera qu'il faut être patient pour obtenir  $r$  succès consécutifs!

soit  $n \in \mathbb{N}, n \geq 0$

(Q2) a) si  $E_{n-r}$  est réalisé à l'époque  $t=0$ . (si  $n=r$  - un pas avec  $t=0$ !)

si  $S_{n-r}$  est réalisé on note  $l$  la longueur de la dernière séquence de succès au cours des  $n-r$  premières expériences.

on note enfin  $i$  le reste dans la division de  $l$  par  $r$ .

Supposons l'événement " $S_{n-(r-1)}$  et ... et  $S_{n-1}$  et  $S_n$ " réalisé.

des  $i$  derniers succès des  $n-r$  premières expériences et les  $r-i$  premiers succès de la liste  $S_{n-(r-1)}, S_{n-(r-2)}, \dots, S_n$  réalisant le seul événement  $U_{n-(r-i)} = U_{n-i}$  de la liste  $U_{n-(r-1)}, U_{n-(r-1)+1}, \dots, U_n$ .

Pour conséquent  $S_{n-(r-1)} \cap \dots \cap S_{n-1} \cap S_n$  est contenu dans la réunion disjointe  $U_{n-(r-1)} \cup \dots \cup U_{n-1} \cup U_n$ .

Donc 
$$p^r = P(S_{n-(r-1)} \cap \dots \cap S_{n-1} \cap S_n) = \sum_{i=0}^{r-1} P(S_{n-(r-1)} \cap \dots \cap S_{n-1} \cap S_n / U_{n-i}) P(U_{n-i})$$

$S_{n-(r-1)} \cap \dots \cap S_{n-1} \cap S_n$  est réalisé, sachant que  $U_{n-i}$  est réalisé ni est possible ni  $S_{n-i+1} \cap S_{n-i+2} \cap \dots \cap S_n$  est réalisé

Pour conséquent 
$$P(S_{n-(r-1)} \cap \dots \cap S_{n-1} \cap S_n / U_{n-i}) = p^i$$

Donc 
$$p^r = \sum_{i=0}^{r-1} p^i P(U_{n-i}) = \sum_{i=0}^{r-1} p^i u_{n-i}$$

Pour conséquent :  $u_n + p u_{n-1} + p^2 u_{n-2} + \dots + p^{r-1} u_{n-r+1} = p^r$  et ceci pour tout  $n \in \llbracket r, +\infty \llbracket$

Notons aussi que :  $u_{r-1} + p u_{r-2} + p^2 u_{r-3} + \dots + p^{r-1} u_0 = p^{r-1} \neq p^r !!$

Alors 1.  $(u_n)_{n \geq 0}$  ne vérifie pas (1)

2.  $(u_n)_{n \geq 1}$  pas davantage car (1) concerne des suites  $(u_n)_{n \geq 0} !$

On ne retombe pas sur pieds qu'en posant  $u_0 = p^r$  !

Utilisons alors I94 et pour dire que : 
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{(1-p)p^r}{1-p^r}$$

b) Pour 2 faces :  $p = \frac{1}{2}$  et  $r = 2$ . 
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{6}$$

Pour 3 faces :  $p = \frac{1}{3}$  et  $r = 2$ . 
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{42}$$

93) a)  $\sum_{n=1}^{+\infty} P(X=n)$  est l'événement : "dans  $r$  succès consécutifs". Pour conséquent

$$P(\sum_{n=1}^{+\infty} P(X=n)) = 1$$
. Par disjointé on obtient 
$$\sum_{n=1}^{+\infty} P(X=n) = 1$$
.



b) doit  $x \in [0, 1[$ .

$$\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n x^n \leq x^n \quad (u_n = p(U_n) \in [0, 1] \text{ pour } n \geq r \text{ et } u_0 = 1, u_1 = u_2 = \dots = u_{r-1} = 0)$$

La série de terme général  $x^n$  étant convergente ( $|x| < 1$ ) il en est de même pour la série de terme général  $u_n x^n$  (règles de comparaison des séries à termes positifs).

Pour tout  $x \in [0, 1[$ ,  $U(x)$  existe.

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n + p u_{n-1} + p^2 u_{n-2} + \dots + p^{r-1} u_{n-r+1} = p^r$$

$$\text{Soit } x \in [0, 1[. \forall n \in \mathbb{N}, u_n x^n + (px)(u_{n-1} x^{n-1}) + \dots + (p^{r-1} x^{r-1}) u_{n-r+1} x^{n-r+1} = p^r x^n$$

En passant à la limite :

$$\sum_{n=r}^{+\infty} u_n x^n + (px) \sum_{n=r}^{+\infty} u_{n-1} x^{n-1} + \dots + (p^{r-1} x^{r-1}) \sum_{n=r}^{+\infty} u_{n-r+1} x^{n-r+1} = p^r \sum_{n=r}^{+\infty} x^n \quad (\text{toutes les séries convergentes})$$

$$\sum_{n=r}^{+\infty} u_n x^n + px \sum_{n=r-1}^{+\infty} u_n x^n + \dots + (p^{r-1} x^{r-1}) \sum_{n=1}^{+\infty} u_n x^n = p^r x^r \frac{1}{1-x}$$

Or  $u_0 = 1$  et  $u_1 = u_2 = \dots = u_{r-1} = 0$ . Par conséquent :

$$\sum_{n=r}^{+\infty} u_n x^n = \sum_{n=r-1}^{+\infty} u_n x^n = \dots = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n x^n = U(x) - u_0 = U(x) - 1$$

$$\text{Donc } (U(x) - 1)(1 + px + \dots + (px)^{r-1}) = \frac{p^r x^r}{1-x}; \quad (U(x) - 1) \frac{1 - (px)^r}{1 - px} = \frac{p^r x^r}{1-x}$$

$$U(x) = 1 + \frac{(px)^r}{1 - (px)^r} \times \frac{1 - px}{1 - x}$$

c) doit  $n \in \mathbb{N}$ . Si  $U_n$  est réalisé on a obtenu une suite de  $r$  succès consécutifs s'attachant à la  $n$  ième expérience ; par conséquent une première suite de  $r$  succès consécutifs n'est attachée à l'une des  $n$  premières expériences.

$$\text{Donc } U_n \subset \bigcup_{k=0}^n \{X=k\}$$

$$u_n = p(U_n) = \sum_{k=0}^n p(X=k \cap U_n) = \sum_{k=0}^n p(U_n | X=k) p(X=k)$$

sachant que

$U_n$  réalisée  $X=k$  et réalisé si les  $n-k$  dernières expériences donnent une suite de  $r$  succès consécutifs qui s'attache à la dernière expérience ... de ces  $n-k$  (dernières) expériences. Donc  $p(U_n | X=k) = u_{n-k}$ . Finalement  $u_n = \sum_{k=0}^n p(X=k) u_{n-k}$

d) C'est le produit de Cauchy.

$$j = k - i; \quad k = j + i$$

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

$$\sum_{k=0}^n c_k = \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} = \sum_{i=0}^n \sum_{k=i}^n a_i b_{k-i} = \sum_{i=0}^n \left( a_i \left( \sum_{j=0}^{n-i} b_j \right) \right)$$

$$\forall i \in [0, n], \quad \sum_{j=0}^{n-i} b_j \leq \sum_{j=0}^n b_j \quad (\forall j \in \mathbb{N}, b_j \geq 0).$$

$$\forall i \in [0, n], \quad a_i \sum_{j=0}^{n-i} b_j \leq a_i \sum_{j=0}^n b_j \quad (\forall k \in \mathbb{N}, a_k \geq 0).$$

donc  $\sum_{i=0}^n \left( a_i \sum_{j=0}^{n-i} b_j \right) \leq \sum_{i=0}^n \left( a_i \sum_{j=0}^n b_j \right) = \sum_{i=0}^n a_i \sum_{j=0}^n b_j$

Finalement  $\sum_{k=0}^n c_k \leq \sum_{i=0}^n a_i \sum_{j=0}^n b_j = \sum_{k=0}^n a_k \sum_{l=0}^n b_l$ .

$$\sum_{k=0}^{2n} c_k = \sum_{k=0}^{2n} \left( \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) \stackrel{\text{positivité des termes des suites}}{\geq} \sum_{i=0}^{2n} \left( \sum_{k=i}^{2n} a_i b_{k-i} \right) \geq \sum_{i=0}^n \left( a_i \sum_{k=i}^{2n} b_{k-i} \right) = \sum_{i=0}^n \left( a_i \sum_{j=0}^{n-i} b_j \right)$$

$\forall i \in [0, n], \quad 2n - i \geq n$  donc  $\forall i \in [0, n], \quad \sum_{j=0}^{2n-i} b_j \geq \sum_{j=0}^n b_j$ . Par conséquent :

$$\sum_{k=0}^{2n} c_k \geq \sum_{i=0}^n \left( a_i \sum_{j=0}^n b_j \right) = \sum_{i=0}^n a_i \sum_{j=0}^n b_j = \sum_{k=0}^n a_k \sum_{l=0}^n b_l$$

Finalement :  $\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^n c_k \leq \sum_{k=0}^n a_k \sum_{l=0}^n b_l \leq \sum_{k=0}^{2n} c_k$ .

Pour  $A = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k$  et  $B = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^n c_k \leq \sum_{k=0}^n a_k \sum_{l=0}^n b_l \leq AB$$

Ceci assure la convergence de la série de terme général  $c_n$  car elle est à termes positifs et ses sommes partielles sont majorées.

Pour passer alors à la limite dans les inégalités précédentes, il vient :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} c_k \leq AB \leq \sum_{k=0}^{+\infty} c_k. \quad \text{Ceci donne : } \sum_{k=0}^{+\infty} c_k = AB = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k \sum_{l=0}^{+\infty} b_l.$$

e) Soit  $x \in [0, 1]$ .  $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq p(x=n) x^n \leq p(x=n)$ .

La série de terme général  $p(x=n)$  converge donc les règles de comparaison des

si les termes positifs donnent la convergence de la série de terme général  $p(x=n)x^n$ .  
 soit  $x \in [0, 1[$ .

Les séries de termes généraux  $p(x=n)x^n$  et  $u_n x^n$  sont à termes positifs et convergentes

Par conséquent :

$$G(x)U(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} p(x=n)x^n \sum_{n=0}^{+\infty} u_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \left( \sum_{k=0}^n p(x=k)x^k u_{n-k} x^{n-k} \right)$$

$$G(x)U(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left( \sum_{k=0}^n p(x=k)u_{n-k} \right) x^n = p(x=0)u_0 x^0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left( \sum_{k=0}^n p(x=k)u_{n-k} \right) x^n$$

$$G(x)U(x) = 0 + \sum_{n=1}^{+\infty} u_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n x^n - 1$$

$u_n \text{ car } n \geq 1$

donc  $\forall x \in [0, 1[, G(x)U(x) = U(x) - 1$ .

$$\text{f) } \forall x \in [0, 1[, G(x) = \frac{U(x)-1}{U(x)} = \frac{\frac{(px)^r}{1-(px)^r} - \frac{1-px}{1-px}}{\frac{(px)^r}{1-(px)^r} + \frac{1-px}{1-px}} = \frac{(px)^r(1-px)}{(1-(px)^r)(1-px) + (px)^r(1-px)}$$

$$\forall x \in [0, 1[, G(x) = \frac{(px)^r(1-px)}{(1-(px)^r)(1-px) + (px)^r(1-px)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(px)^r(1-px)}{(1-(px)^r)(1-px) + (px)^r(1-px)} = \frac{p^r(1-p)}{p^r(1-p)} = 1 = \sum_{n=0}^{+\infty} p(x=n) = G(1)$$

Par conséquent :  $G$  est continue en 1. Notons que :  $\forall x \in [0, 1[, G(x) = \frac{(px)^r(1-px)}{(1-(px)^r)(1-px) + (px)^r(1-px)}$

Q4 a)  $E(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} n p(X=n) = \sum_{n=1}^{+\infty} n p(X=n) = G'(1)$

$$\forall x \in [0, 1[, G'(x) = \frac{p^r [rx^{r-1}(1-px) + x^r(-p)] [(1-(px)^r)(1-px) + (px)^r(1-px)] - (px)^r(1-px) \times 0'(x)}{[(1-(px)^r)(1-px) + (px)^r(1-px)]^2}$$

avec  $D(x) = (1-(px)^r)(1-px) + (px)^r(1-px)$  pour tout  $x \in [0, 1]$

donc  $\forall x \in [0, 1[, D'(x) = -p^r r x^{r-1}(1-px) - (1-(px)^r) + p^r r x^{r-1}(1-px) + (px)^r(-p)$

$D(1) = p^r(1-p)$  et  $D'(1) = -1 + p^r + r p^r(1-p) - p^{r+1} = -1 + p^r(r+1)(1-p)$

$$G'(1) = \frac{1}{(p^r(1-p))^2} [p^r(r(1-p)-p)(p^r(1-p)) - p^r(1-p)(-1+p^r(r+1)(1-p))]$$

$$G'(1) = \frac{1}{p^r(1-p)} [r p^r(1-p) - p^{r+1} + 1 - p^r(r+1)(1-p)] = \frac{1-p^r}{(1-p)p^r} \cdot E(X) = \frac{1-p^r}{(1-p)p^r}$$

$$p = \frac{1}{2}$$

$$r = 5$$

$$E(X) = 620$$

$$3' 2''$$

$$r = 10$$

$$E(X) = 20460$$

$$34' 6''$$

$$r = 25$$

$$E(X) = 67\ 108\ 8620$$

$$776\text{ j } 17\text{ h } 21' 2''$$

$$p = \frac{1}{6}$$

$$r = 5$$

$$E(X) = 93300$$

$$2\text{ h } 35' 30''$$

$$E(X) = 72\ 559\ 4100$$

$$839\text{ j } 19\text{ h } 23' 30''$$

$$E(X) \approx 3,4 \times 10^{19}$$

$$\approx 1081\ 822\ \text{milliards d'années}$$

$$\approx 1082\ \text{milliards d'années.}$$