

**Exercice**

$E$  est l'espace vectoriel réel des suites réelles indexées par  $\mathbb{N}$ .

On définit pour tout élément  $u = (u_n)_{n \geq 0}$  de  $E$  la suite  $v = \Delta(u)$  par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \frac{1}{n+1}(u_0 + u_1 + \dots + u_n).$$

**Q1** Montrer que l'application  $\Delta$  ainsi définie est un endomorphisme de  $E$ .

**Q2** On considère un réel  $\lambda$  n'appartenant pas à l'ensemble  $S = \left\{ \frac{1}{p+1} ; p \in \mathbb{N} \right\}$ .

Soit  $u = (u_n)_{n \geq 0}$  un élément de  $\text{Ker}(\Delta - \lambda \text{Id}_E)$ . Montrer par une récurrence adaptée que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 0$ .

Qu'en déduire pour le spectre de  $\Delta$  ?  $\Delta$  est-il injectif ?

**Q3** On rappelle que si  $r$  et  $s$  sont deux éléments de  $\mathbb{N}$  tels que  $s \geq r$  :

$$\binom{r}{r} + \binom{r+1}{r} + \binom{r+2}{r} + \dots + \binom{s}{r} = \binom{s+1}{r+1}.$$

a) Soit  $p$  un élément de  $\mathbb{N}$ . On pose  $\lambda = \frac{1}{p+1}$  et on considère la suite  $(u_n)_{n \geq 0}$  définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \begin{cases} \binom{n}{p} & \text{si } n \geq p \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Vérifier que  $\Delta(u) = \lambda u$ .

b) Préciser le spectre de  $\Delta$ .

**Q4** Soit  $p$  un élément de  $\mathbb{N}$ . On pose  $\lambda = \frac{1}{p+1}$ . Déterminer  $\text{SEP}(\Delta, \lambda)$ .

**Q5** Facultatif Étudier la surjectivité de  $\Delta$ .

**Q1** Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$  et soit  $u = (u_n)_{n \geq 0}$  et  $u' = (u'_n)_{n \geq 0}$  deux éléments de  $E$ .

$$\Delta(\lambda u + u') = \Delta \left( (\lambda u_n + u'_n)_{n \geq 0} \right) = \left( \frac{\lambda(u_0 + u'_0) + (u_1 + u'_1) + \dots + (\lambda u_n + u'_n)}{n+1} \right)_{n \geq 0}$$

$$\Delta(\lambda u + u') = \left( \lambda \frac{u_0 + u_1 + \dots + u_n}{n+1} + \frac{u'_0 + u'_1 + \dots + u'_n}{n+1} \right)_{n \geq 0} = \lambda \left( \frac{u_0 + u_1 + \dots + u_n}{n+1} \right)_{n \geq 0} + \left( \frac{u'_0 + u'_1 + \dots + u'_n}{n+1} \right)_{n \geq 0}$$

$\Delta(\lambda u + u') = \lambda \Delta(u) + \Delta(u')$ . Ainsi  $\Delta$  est linéaire.

$\Delta$  étroit une application de  $E$  dans  $E$  (si  $u \in E, v = \Delta(u)$  et bien une suite de réels à dessein par  $\mathbb{N}$ ),  $\Delta$  est alors un endomorphisme de  $E$ .

**Q2** Montrons à l'aide d'une récurrence "forte" que :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 0$ .

Revenons d'abord que  $u \in \text{Ker}(\Delta - \lambda \text{Id}_E)$  donc  $\Delta(u) = \lambda u$  et

ainsi  $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{u_0 + u_1 + \dots + u_n}{n+1} = \lambda u_n$ .

- $u_0 = \lambda u_0$ ;  $(\lambda - 1)u_0 = 0$ . Or  $\lambda \neq 1 \Rightarrow \lambda = 1$ ;  $p \in \mathbb{N}$  donc  $\lambda$  est différent de  $\frac{1}{0+1} = 1$ . Ainsi  $u_0 = 0$ .
- Supposons que pour  $n$  dans  $\mathbb{N}$  on ait:  $u_0 = u_1 = \dots = u_n = 0$ . Montrons alors que  $u_{n+1} = 0$ .  $\frac{HE}{\downarrow} = \frac{u_{n+1}}{n+2}$ ; alors  $(\lambda - \frac{1}{n+2})u_{n+1} = 0$ .
- Or  $\lambda \neq \frac{1}{n+2}$  donc  $\lambda \neq \frac{1}{n+2}$ ; ainsi  $u_{n+1} = 0$ . Ceci a lieu à la suite de la récurrence.

Finalement  $\underline{u = 0_E}$ . Par conséquent  $\underline{Ker(\Delta - \lambda Id_E) = \{0_E\}}$ .

Ce qui prouve même que les éléments de  $\mathbb{R} \setminus S$  ne sont pas des éléments du spectre de  $\Delta$ . Alors le spectre de  $\Delta$  est exac dans  $S = \{ \frac{1}{p+1} ; p \in \mathbb{N} \}$ .

Or  $\delta$  donc  $0 \notin Sp \Delta$  et ainsi  $\Delta$  est injectif.

Q3) a) Posons  $v = (v_n)_{n \geq 0} = \Delta(u)$ . Montrons que  $v = \lambda u$  où  $\lambda = \frac{1}{p+1}$ .

Montrons que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $v_n = \lambda u_n$ .

Si  $p \geq 1$ :  $\forall n \in [0, p-1]$ ,  $u_n = 0$

Si  $p \geq 1$ :  $\forall n \in [0, p-1]$ ,  $v_n = \frac{u_0 + u_1 + \dots + u_n}{n+1} = 0 = \lambda u_n = \lambda u_n$ .

Montrons alors que  $\forall n \in [p, +\infty[$ ,  $v_n = \lambda u_n$  ou  $v_n = \frac{1}{p+1} u_n$ .

doit  $n \in [p, +\infty[$ .

$$v_n = \frac{1}{n+1} (u_0 + \dots + u_n) = \frac{1}{n+1} (u_p + u_{p+1} + \dots + u_n) = \frac{1}{n+1} \left[ \binom{p}{p} + \binom{p+1}{p} + \dots + \binom{n}{p} \right]$$

$$\text{Alors } v_n = \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{p+1} = \frac{1}{n+1} \frac{n+1}{p+1} \binom{n}{p} = \frac{1}{p+1} u_n = \lambda u_n.$$

↑  
car que

Finalement  $\Delta(u) = \lambda u$ .  $\forall u \neq 0_E$  (par exemple  $u_p = 1$ ) donc

$\lambda = \frac{1}{p+1}$  est une valeur propre de  $\Delta$  et  $u$  est un vecteur propre associé.

b) Nous venons de voir que  $\forall p \in \mathbb{N}, \frac{1}{p+1} \in Sp \Delta$ .

Ainsi  $\mathcal{S} \subset Sp \Delta$ . Soit  $\mathcal{Q}$  ce nous avons vu que  $Sp \Delta \subset \mathcal{S}$ .

Finalement  $Sp \Delta = \mathcal{S} = \left\{ \frac{1}{p+1}; p \in \mathbb{N} \right\}$ .

Q4) Posons  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n(p) = \begin{cases} \binom{n}{p} & \text{si } n \geq p \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ .

Il nous a montré que  $(u_n(p))_{n \geq 0}$  est un élément non nul de  $SEP(\Delta, \frac{1}{p+1})$ .

Alors  $\text{Vect}((u_n(p))_{n \geq 0}) \subset SEP(\Delta, \frac{1}{p+1})$ . Nous allons montrer l'inclusion

contraire. Posons  $\lambda = \frac{1}{p+1}$  et prenons un élément  $u = (u_n)_{n \geq 0}$  de

$SEP(\Delta, \frac{1}{p+1}) = SEP(\Delta, \lambda)$ . Alors  $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{u_0 + u_1 + \dots + u_n}{n+1} = \lambda u_n$ .

Si  $u = 0_E$  il est alors clair que  $u \in \text{Vect}((u_n(p))_{n \geq 0})$ .

Supposons  $u \neq 0_E$ . Soit  $k$  le plus petit élément de  $\{n \in \mathbb{N}, u_n \neq 0\}$

(il existe car  $\{n \in \mathbb{N} \mid u_n \neq 0\}$  est une partie non vide de  $\mathbb{N}$ ).

Avec cette précision nous pouvons écrire que  $u_0 = u_1 = \dots = u_{k-1} = 0$ .

Soit tous les cas nous avons  $\frac{u_0 + u_1 + \dots + u_k}{k+1} = \frac{u_k}{k+1}$  et  $\frac{u_0 + u_1 + \dots + u_k}{k+1} = \lambda u_k$ .

Ainsi  $\frac{u_k}{k+1} = \lambda u_k = \frac{u_k}{p+1}$ . Comme  $u_k \neq 0$  (pas nul) :  $\frac{1}{k+1} = \frac{1}{p+1}; k=p$ .

Notons alors que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_p \times u_n(p)$  (ok !!).

c'est déjà clair pour  $n \in \{0, p-1\}$  ( $n$  est nul ou  $n$  n'est pas vide ...)

car  $u_0 = u_1 = \dots = u_{p-1} = 0$  et  $u_0(p) = u_1(p) = \dots = u_{p-1}(p) = 0$ .

Notons à l'aide d'une récurrence facile que  $\forall n \in \mathbb{N}, \forall p \in \mathbb{N}, u_n = u_p \times u_n(p)$

- La propriété est vraie pour  $p=1$  car  $u_p = u_p \times 1 = u_p \times u_p(p)$ .
- Soit  $n \in \mathbb{N}, n \geq 0$ . Supposons la propriété vraie pour tous les éléments de  $\mathbb{N}, n \geq 0$  et montrons la pour  $n+1$ .

$$(u_n)_{n \geq 0} \in \text{SER}(\Delta, \lambda) \text{ donc } \frac{u_0 + u_1 + \dots + u_{n+1}}{n+2} = \lambda u_{n+1} \text{ et ainsi}$$

$\uparrow$  dès lors...

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = (\lambda(n+2) - 1) u_{n+1}. \text{ De même comme } (u_n(p))_{n \geq 0} \in \text{SER}(\Delta, \lambda)$$

$$u_0(p) + u_1(p) + \dots + u_n(p) = (\lambda(n+2) - 1) u_{n+1}(p).$$

$$\text{Ainsi: } (\lambda(n+2) - 1) u_{n+1} = \underbrace{u_0 + u_1 + \dots + u_n}_p = u_p [u_0(p) + u_1(p) + \dots + u_n(p)].$$

$$\text{Donc } (\lambda(n+2) - 1) u_{n+1} = u_p (\lambda(n+2) - 1) u_{n+1}(p).$$

$$\text{Soit } (\lambda(n+2) - 1) [u_{n+1} - u_p u_{n+1}(p)] = 0.$$

$$\text{Or } \lambda = \frac{1}{p+1} \text{ et } n+2 \geq p+2 \text{ donc } \lambda(n+2) \geq \frac{p+2}{p+1} > 1.$$

Alors  $\lambda(n+2) - 1 \neq 0$ . Ainsi  $u_{n+1} = u_p u_{n+1}(p)$  et la récurrence s'achève.

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_p u_n(p). \text{ Prenons } \sigma = u_p.$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \sigma u_n(p); \quad (u_n)_{n \geq 0} = \sigma (u_n(p))_{n \geq 0}.$$

Donc  $(u_n)_{n \geq 0} \in \text{Vect}((u_n(p))_{n \geq 0})$  et ceci achève de montrer que

$$\text{SER}(\Delta, \frac{1}{p+1}) = \text{Vect}((u_n(p))_{n \geq 0}).$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \text{SER}(\Delta, \frac{1}{p+1}) = \text{Vect}((u_n(p))_{n \geq 0}) \text{ ou } (u_n(p))_{n \geq 0} \text{ et la suite}$$

$$\text{est définie par: } \underline{u_n(p)} = \begin{cases} \binom{n}{p} p^n & n \geq p \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Q5 • Une petite analyse pour commencer.

Soit  $u = (u_n)_{n \geq 0} \in E$ . Posons  $v = (v_n)_{n \geq 0} = \Delta(u)$ .

$$\forall n \in \mathbb{N}, \frac{u_0 + u_1 + \dots + u_n}{n+1} = v_n. \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_0 + u_1 + \dots + u_n = (n+1)v_n = (n+1)v_n - n v_{n-1}.$$

Alors  $u_0 = v_0$  et  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $u_n = (u_0 + \dots + u_n) - (u_0 + \dots + u_{n-1}) = (n+1)v_n - n v_{n-1}$ .

$$\text{D'où } u_0 = v_0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = (n+1)v_n - n v_{n-1}.$$

Remarque... Ce vecteur que l'on énoncé de  $E$  a une plus ou moins grande

$\Delta$  dans  $E$ , non? Le vecteur ainsi énoncé est injectif de  $\Delta$  et cela dans presque toute la partie de  $E$  que  $\Delta$  est surjectif.

• Notons que  $\Delta$  est surjectif. Soit  $\omega = (\omega_n)_{n \geq 0} \in E$ .

Posons  $u_0 = \omega_0$  et  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $u_n = (n+1)\omega_n - n\omega_{n-1}$ .

Posons aussi  $u = (u_n)_{n \geq 0}$ .  $u \in E$ . Notons que  $\Delta(u) = \omega$ .

Soit à noter que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\frac{u_0 + u_1 + \dots + u_n}{n+1} = \omega_n$ .

C'est égalité est vraie pour  $n=0$ . Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

$$\frac{u_0 + u_1 + \dots + u_n}{n+1} = \frac{1}{n+1} \left[ \omega_0 + \sum_{k=1}^n ((k+1)\omega_k - k\omega_{k-1}) \right] = \frac{1}{n+1} [\omega_0 + (n+1)\omega_n - \omega_0] = \omega_n.$$

Finalement  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\frac{u_0 + u_1 + \dots + u_n}{n+1} = \omega_n$ .  $\Delta(u) = \omega$ .

Nous avons de même que :  $\forall \omega \in E$ ,  $\exists u \in E$ ,  $\Delta(u) = \omega$ .

Ainsi  $\Delta$  est surjectif.

$\Delta$  est un isomorphisme injectif et surjectif de  $E$ . Soit  $u$  un élément de  $E$ .

Remarque... Soit  $u = (u_n)_{n \geq 0} \in E$ . Posons  $v = (v_n)_{n \geq 0} = \Delta'(u)$ .

$$\text{Alors } \forall n \in \mathbb{N}, v_n = \begin{cases} u_0 & \text{si } n=0 \\ (n+1)u_n - nu_{n-1} & \text{si } n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

**EXERCICE 52**

N2

Endomorphisme d'un espace vectoriel de suites 4 ESCP 2010 2.3.

On note  $\mathcal{S} = \{(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}, \text{ avec } x_n \in \mathbb{R} \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n, \lim_{n \rightarrow -\infty} x_n \text{ existent}\}$ .

Nous comprendrons que  $\mathcal{S}$  est l'ensemble des suites réelles  $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  indexées par  $\mathbb{Z}$  telles  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(x_{-n})_{n \in \mathbb{N}}$  soient convergentes (donc de limites finies...).

Q1. Montrer que  $\mathcal{S}$  est un sous-espace vectoriel du  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des suites réelles indexées par  $\mathbb{Z}$ .

Soit  $T$  l'application définie sur  $\mathcal{S}$  par  $T((x_n)_{n \in \mathbb{Z}}) = (y_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ , avec pour tout  $n \in \mathbb{Z} : y_n = x_{n-1} + x_{n+1}$ .

Q2. Montrer que  $T$  est un endomorphisme de  $\mathcal{S}$ . Déterminer son noyau.

Dans la suite de l'exercice, on s'intéresse aux valeurs propres réelles de  $T$ , c'est-à-dire aux réels  $\lambda$  tels que  $\text{Ker}(T - \lambda Id) \neq \{0\}$ , où  $Id$  désigne l'endomorphisme identité de  $\mathcal{S}$  et on pose  $A_\lambda = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \lambda \end{pmatrix}$ .

Q3. Soit  $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \mathcal{S}$ . Pour tout  $k \in \mathbb{Z}$ , on pose  $U_k = \begin{pmatrix} x_k \\ x_{k+1} \end{pmatrix}$ .

Montrer que  $x \in \text{Ker}(T - \lambda Id)$  si et seulement si pour tout  $k$  de  $\mathbb{Z}$ ,  $U_{k+1} = A_\lambda U_k$ .

En déduire que pour tout  $k$  de  $\mathbb{Z}$ , on a alors :  $U_k = A_\lambda^k U_0 \dots$  **si  $x \in \text{Ker}(T - \lambda Id)$  !**

Q4. a) On suppose que  $\lambda \notin \{-2, 2\}$ . Montrer que  $A_\lambda$  est diagonalisable dans  $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ .

En déduire que si  $x = (x_k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \text{Ker}(T - \lambda Id)$ , il existe des nombres complexes  $\alpha, \beta, \mu_1, \mu_2$  tels que, pour tout  $k$  de  $\mathbb{Z}$ , on ait :  $x_k = \alpha \mu_1^k + \beta \mu_2^k$ .

En distinguant les deux cas  $|\lambda| > 2$  et  $|\lambda| < 2$ , montrer que  $\text{Ker}(T - \lambda Id) = \{0\}$ .

b) Que peut-on dire de  $\text{Ker}(T - 2Id)$  ?

c) Montrer que  $\text{Ker}(T + 2Id) = \{0\}$ .

Conclure.

Q3) Notons  $\mathcal{E}$  l'espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$  des suites réelles indexées par  $\mathbb{Z}$ .

•  $\mathcal{S} \subset \mathcal{E}$ .

• et cela veut dire que  $0 \in \mathcal{E}$  et que  $\mathcal{S} \neq \emptyset$ .

• Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Soit  $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  et  $y = (y_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  deux éléments de  $\mathcal{S}$ .

Les suites  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (x_{-n})_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_{-n})_{n \in \mathbb{N}}$  sont convergentes.

Donc les suites  $\lambda(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, \lambda(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $\lambda(x_{-n})_{n \in \mathbb{N}} + \lambda(y_{-n})_{n \in \mathbb{N}}$  convergent comme combinaisons linéaires de deux suites convergentes. Alors les suites  $(\lambda x_n + y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(\lambda x_{-n} + y_{-n})_{n \in \mathbb{N}}$  convergent donc  $\lambda x + y = (\lambda x_n + y_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  est un élément de  $\mathcal{S}$ .

$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall (x, y) \in \mathcal{S}^2, \lambda x + y \in \mathcal{S}$ .

Ceci achève de montrer que l'ensemble  $\mathcal{S}$  est un sous-espace vectoriel du  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des suites réelles indexées par  $\mathbb{Z}$ .

Q2 • Soit  $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  un élément de  $\mathcal{S}$ . Posons  $(y_n)_{n \in \mathbb{Z}} = T((x_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ .

$$\forall n \in \mathbb{Z}, y_n = x_{n-1} + x_{n+1} \quad (y_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \mathbb{E}.$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, y_n = x_{n-1} + x_{n+1} \quad \text{et} \quad y_{-n} = x_{-n-1} + x_{-n+1}.$$

$(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont deux suites convergentes. Alors les suites  $(x_{n-1})_{n \in \mathbb{N}}$ ,

$(x_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ ,  $(x_{-n-1})_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(x_{-n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  convergent. Par somme  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et

$(y_{-n})_{n \in \mathbb{N}}$  converge. Mais  $y \in \mathcal{S}$ .  $\forall (x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \mathcal{S}$ .

$\forall x \in \mathcal{S}, T(x) \in \mathcal{S}$ .  $T$  est une application de  $\mathcal{S}$  dans  $\mathcal{S}$ .

• Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Soit  $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  et  $y = (y_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  deux éléments de  $\mathcal{S}$ .

$$T(\lambda x + y) = T((\lambda x_n + y_n)_{n \in \mathbb{Z}}) = (\lambda x_{n-1} + y_{n-1} + \lambda x_{n+1} + y_{n+1})_{n \in \mathbb{Z}} = (\lambda(x_{n-1} + x_{n+1}) + (y_{n-1} + y_{n+1}))_{n \in \mathbb{Z}}.$$

$$T(\lambda x + y) = \lambda(x_{n-1} + x_{n+1})_{n \in \mathbb{Z}} + (y_{n-1} + y_{n+1})_{n \in \mathbb{Z}} = \lambda T(x) + T(y).$$

$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall (x, y) \in \mathcal{S}, T(\lambda x + y) = \lambda T(x) + T(y)$ . T est linéaire.

Ainsi  $T$  est un endomorphisme de  $\mathcal{S}$ .

Soit  $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  un élément de  $\mathcal{K} \setminus \mathcal{T}$ .  $T(x) = 0_{\mathcal{S}}$ .  $\forall n \in \mathbb{Z}, x_{n-1} + x_{n+1} = 0$ .

En particulier  $\forall n \in \mathbb{N}^*, x_{n+1} = -x_{n-1}$ . Alors  $\forall p \in \mathbb{N}, x_{2p+2} = -x_{2p}$ .

$(x_{2p})_{p \in \mathbb{N}}$  est géométrique de raison  $(-1)$ . Alors  $\forall p \in \mathbb{N}, x_{2p} = (-1)^p x_0$ .

$(-1)^p$   $p \in \mathbb{N}$  est une suite divergente. Si  $x_0 \neq 0$  la suite  $(x_{2p})_{p \in \mathbb{N}}$  diverge.  $x_0$

et donc de même de la suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  (ni  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge  $(x_{2p})_{p \in \mathbb{N}}$  converge ...).

ceci cache dit l'appartenance de  $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  à  $\mathcal{S}$ .

Ainsi  $x_0 = 0$  et  $\forall p \in \mathbb{N}, x_{2p} = 0$ . Mais par récurrence que  $\forall p \in \mathbb{N}, x_{-2p} = 0$ .

c'est vrai pour  $p=0$ . Supposons que  $x_{-2p} = 0$  pour  $p \in \mathbb{N}$  et montrons que  $x_{-2(p+1)} = 0$ .

Ainsi  $0 = x_{(-2p-1)-1} + x_{(-2p-1)+1} = x_{-2p-2} + x_{-2p} = x_{-2p-2}$ . Donc  $x_{-2(p+1)} = 0$   
ceci achève la récurrence.

$$\forall p \in \mathbb{N}, x_{2p} = x - y = 0. \quad \underline{\forall x \in \mathbb{Z}, x_{2n} = 0.}$$

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, x_{2p-1} + x_{2p+1} = 0. \quad \forall p \in \mathbb{N}^*, x_{2p+1} = -x_{2p-1}.$$

Alors  $\forall p \in \mathbb{N}, x_{2p+1} = (-1)^p x_1$  et  $(x_{2p+1})_{p \in \mathbb{N}}$  converge. Comme  $(-1)^p p \in \mathbb{N}$

diverge nous avons  $x_1 = 0. \quad \forall p \in \mathbb{N}, x_{2p+1} = 0.$

notons par récurrence que  $\forall p \in \mathbb{N}, x_{-(2p+1)} = 0.$

$x_{-1} + x_1 = 0$  et  $x_1 = 0$  donc  $x_{-1} = 0$  et la propriété est vraie pour  $p = 0.$

supposons la propriété vraie pour  $p$  et notons  $(c$  pour  $p+1. \quad x_{-(2p+1)} = 0.$

$$x_{-(2p+3)} = \frac{x_{-(2p+1)} + x_{-(2p+1)}}{p} = \frac{x_{-(2p+1)}}{p-1} + \frac{x_{-(2p+1)}}{p} = 0. \quad \text{ceci a déjà été vérifié.}$$

$$\forall p \in \mathbb{N}, x_{2p+1} = x_{-(2p+1)} = 0. \quad \underline{\forall n \in \mathbb{Z}, x_{2n+1} = 0.}$$

$$\forall n \in \mathbb{Z}, x_{2n} = x_{2n+1} = 0 \quad \text{donc} \quad x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}} = 0y.$$

Finalement  $\text{Ker } T = \{0y\}.$

$$\textcircled{Q3} \quad x \in \text{Ker}(T - \lambda \text{Id}_E) \Leftrightarrow T(x) = \lambda x \Leftrightarrow \forall k \in \mathbb{Z}, x_{k-1} + x_{k+1} = \lambda x_k.$$

$$x \in \text{Ker}(T - \lambda \text{Id}_E) \Leftrightarrow \forall k \in \mathbb{Z}, x_k + x_{k+2} = \lambda x_{k+1} \quad (\text{à multiplier par } x_{k+1} \text{ à la suite !}).$$

$$x \in \text{Ker}(T - \lambda \text{Id}_E) \Leftrightarrow \forall k \in \mathbb{Z}, \begin{cases} x_{k+1} = \lambda x_{k+1} \\ -x_k + \lambda x_{k+1} = x_{k+2} \end{cases}$$

$$x \in \text{Ker}(T - \lambda \text{Id}_E) \Leftrightarrow \forall k \in \mathbb{Z}, \begin{pmatrix} x_{k+1} \\ -x_k + \lambda x_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{k+1} \\ x_{k+2} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \forall k \in \mathbb{Z}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_k \\ x_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{k+1} \\ x_{k+2} \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ainsi } x \in \text{Ker}(T - \lambda \text{Id}_E) \Leftrightarrow \forall k \in \mathbb{Z}, A_{\lambda} U_k = U_{k+1}.$$

$$\underline{\underline{x \in \text{Ker}(T - \lambda \text{Id}_E) \Leftrightarrow \forall k \in \mathbb{Z}, U_{k+1} = A_{\lambda} U_k.}}$$

Remarque -  $A_{\lambda} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \lambda \end{pmatrix} \quad \left| \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \lambda \end{pmatrix} \right| = 0 \cdot \lambda - (-1) \cdot 1 = 1 \neq 0. \quad \underline{\underline{A_{\lambda} \text{ est donc inversible.}}}$

Alors  $A_{\lambda}^n$  est définie pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ . Rappelons que si  $x \in \text{Ker } x_{10}, A^n = (A^{-1})^{|n|}$  car  $(A^{-n})^{-1} = A^n$ .



• supposons que  $\forall k \in \mathbb{Z}, u_k = A_\lambda^k u_0$ .

Alors  $\forall k \in \mathbb{Z}, u_{k+1} = A_\lambda^{k+1} u_0 = A (A_\lambda^k u_0) = A u_k$  donc  $\exists \in \text{Ker}(T - \lambda \text{Id}_E)$ .

• C'est pourquoi il suffit de montrer que  $\exists \in \text{Ker}(T - \lambda \text{Id}_E)$ . Alors  $\forall k \in \mathbb{Z}, u_{k+1} = A_\lambda u_k$

Notons par récurrence que  $\forall k \in \mathbb{N}, u_{-k} = A_\lambda^{-k} u_0$  et  $u_k = A_\lambda^k u_0$ .

• La propriété est vraie pour  $k=0$  car  $A_\lambda^0 = A_\lambda^0 = I_E$ .

• Supposons la propriété vraie pour  $k$  dans  $\mathbb{N}$  et montrons la pour  $k+1$ .

$$A_\lambda u_{-k-1} = u_{-(k+1)} \text{ donc } u_{-(k+1)} = A_\lambda^{-1} u_{-k} = A_\lambda^{-1} A_\lambda^{-k} u_0 = A_\lambda^{-(k+1)} u_0.$$

$A_\lambda u_k = u_{k+1}$  donc  $u_{k+1} = A_\lambda u_k = A_\lambda A_\lambda^k u_0 = A_\lambda^{k+1} u_0$ . Ceci achève la récurrence.

Ainsi  $\forall k \in \mathbb{N}, u_{-k} = A_\lambda^{-k} u_0$  et  $u_k = A_\lambda^k u_0$ . Donc  $\forall k \in \mathbb{Z}, u_k = A_\lambda^k u_0$ .

Finalement  $\exists \in \text{Ker}(T - \lambda \text{Id}_E) \Leftrightarrow \forall k \in \mathbb{Z}, u_k = A_\lambda^k u_0$ .

(Q4)  $\{ \lambda \in \mathbb{C} \mid \lambda \in \mathbb{Z}, 2 \}$  . doit  $y \in \mathbb{C}$ .

$$y \in \text{Sp}(A_\lambda) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -y & 1 \\ -1 & \lambda - y \end{pmatrix} \text{ inversible} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} -y & 1 \\ -1 & \lambda - y \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -y(\lambda - y) + 1 = 0 \Leftrightarrow y^2 - \lambda y + 1 = 0.$$

Le discriminant de l'équation du second degré  $y \in \mathbb{C} \ni y^2 - \lambda y + 1 = 0$  est  $\lambda^2 - 4$ .

Or  $\lambda^2 - 4 \neq 0$  car  $\lambda \in \mathbb{Z} \setminus \{1, -1\}$ . Ainsi cette équation a admet deux solutions distinctes

$y_1$  et  $y_2$ .

Alors  $\text{Sp}(A_\lambda) = \{y_1, y_2\}$ ,  $y_1 \neq y_2 \ni A_\lambda \in \Pi_2(\mathbb{C})$  donc  $A_\lambda$  est diagonalisable dans  $\Pi_2(\mathbb{C})$ .

Ainsi il existe une matrice inversible  $P$  de  $\Pi_2(\mathbb{C})$  telle que  $P^{-1} A_\lambda P = D_\lambda$  où

$$D_\lambda = \text{Diag}(y_1, y_2). \quad A_\lambda = P D_\lambda P^{-1}.$$

Alors  $\forall k \in \mathbb{N}, A_\lambda^k = (P D_\lambda P^{-1})^k = P D_\lambda^k P^{-1} = P \text{Diag}(y_1^k, y_2^k) P^{-1}$ . Soit  $k \in \mathbb{Z} \cap \mathbb{N}$ .

$$\text{On a } A_\lambda^{-k} = (A_\lambda^k)^{-1} = (P D_\lambda P^{-1})^{-k}.$$

$\text{Sp}(D_\lambda) = \text{Sp}(A_\lambda)$  et  $A_\lambda$  est inversible. Donc  $0 \notin \text{Sp}(A_\lambda)$ . Alors  $0 \notin \text{Sp}(D_\lambda)$ . Diagonalisable.

$$\text{Ainsi } (P D_\lambda P^{-1})^{-k} = (P^{-1})^{-1} D_\lambda^{-k} P^{-1} = P \text{Diag}\left(\frac{1}{y_1^k}, \frac{1}{y_2^k}\right) P^{-1}$$

$$\text{Ainsi } A_\lambda^{-k} = (P D_\lambda P^{-1})^{-k} = (P \text{Diag}\left(\frac{1}{y_1^k}, \frac{1}{y_2^k}\right) P^{-1})^{-k}.$$

ce qui donne :  $A_1^k = P(D_1^{-1})^{-k} P^{-1} = P(\text{Diag}(\frac{1}{j_1^k}, \frac{1}{j_2^k}))^{-k} P^{-1} \text{ car } -k \in \mathbb{N}$ .

donc  $A_1^k = P D_1^k P^{-1} = P \text{Diag}((\frac{1}{j_1})^{-k}, (\frac{1}{j_2})^{-k}) P^{-1} = P \text{Diag}(j_1^k, j_2^k) P^{-1}$ .

Finalement  $\forall k \in \mathbb{Z}$ ,  $A_1^k = P D_1^k P^{-1} = P \text{Diag}(j_1^k, j_2^k) P^{-1}$ .

Soit  $x = (x_1 | x_2) \in \mathbb{Z}$  ou  $\mathbb{R}$  (on écrit de  $K_2(T-\lambda I) d_2$ ). Soit  $k \in \mathbb{Z}$ .

$x_1$  et la partie éigène de  $u_k$  d'ac de  $P D_1^k P^{-1} u_0$  ou de  $P D_1^k P^{-1} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix}$ .

Intervenons nous à la partie éigène de  $P D_1^k P^{-1}$  pour  $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  et  $P^{-1} = \begin{pmatrix} c' & b' \\ d' & a' \end{pmatrix}$ .

$$D_1^k P^{-1} = \begin{pmatrix} j_1^k & 0 \\ 0 & j_2^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c' & b' \\ d' & a' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c' j_1^k & b' j_1^k \\ c' j_2^k & d' j_2^k \end{pmatrix}.$$

la partie éigène de  $P D_1^k P^{-1}$  est alors  $(a c' j_1^k + b c' j_2^k \quad a b' j_1^k + b d' j_2^k)$

(comme  $u_0$  est la partie éigène  $P D_1^k P^{-1} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix}$ ) on voit :

$$u_k = (a c' j_1^k + b c' j_2^k) x_0 + (a b' j_1^k + b d' j_2^k) x_1 \text{ ou :}$$

$$u_k = (a c' x_0 + a b' x_1) j_1^k + (b c' x_0 + b d' x_1) j_2^k.$$

$$\text{Pour } \alpha = a c' x_0 + a b' x_1 \text{ et } \beta = b c' x_0 + b d' x_1. \quad \forall \alpha \text{ et } \beta \in \mathbb{C}.$$

$$u_k = \alpha j_1^k + \beta j_2^k \text{ et ceci pour tout } k \text{ dans } \mathbb{Z}.$$

$\exists (a, b) \in \mathbb{C}^2, \exists (j_1, j_2) \in \mathbb{C}^2, \forall k \in \mathbb{Z}, u_k = \alpha j_1^k + \beta j_2^k$ .

Exercice 1. Montrer que l'on peut prendre  $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ j_1 & j_2 \end{pmatrix}$

Montrer alors que  $P^{-1} = \frac{1}{j_2 - j_1} \begin{pmatrix} -j_2 & 1 \\ j_1 & -1 \end{pmatrix}$  et que pour tout  $k \in \mathbb{Z}$

$$x_k = \frac{j_1 - x_0 j_2}{j_2 - j_1} j_1^k + \frac{x_0 j_1 - x_2}{j_1 - j_2} j_2^k.$$

2. Noter que l'identité on utilise la courbe sur les points satisfaisant à une relation de récurrence linéaire d'ordre 2.

Rappelons que  $y_1$  et  $y_2$  sont les solutions de l'équation du second degré  $z^2 - \lambda z + 1 = 0$  dont le discriminant est  $\lambda^2 - 4$ .

cas  $|\lambda| > 2$ . Alors  $\lambda^2 - 4 > 0$ . Soit  $y_1 \in \mathbb{R}$  et  $y_2 \in \mathbb{R}$ .

$$z_0 = \alpha + \beta \text{ et } z_1 = \alpha y_1 + \beta y_2. \text{ Un calcul simple donne } \alpha = \frac{z_0 y_1 - z_1}{y_1 - y_2} \text{ et } \beta = \frac{z_0 y_2 - z_1}{y_1 - y_2}.$$

Ainsi  $\alpha$  et  $\beta$  sont réels.

$$\forall n \in \mathbb{Z}, z_n = \alpha y_1^n + \beta y_2^n. \quad y_1 y_2 = 1 \text{ et } y_1 + y_2 = \lambda.$$

$$\text{Alors } |z_n| = |y_1 y_2|^n = |y_1|^n |y_2|^n \text{ et } \varepsilon < |\lambda| = |y_1 + y_2| \leq |y_1| + |y_2|.$$

$$\text{Si } |y_1| = |y_2| \text{ alors } |y_1| = |y_2| = 1 \text{ et } \varepsilon < |y_1| + |y_2| = 2 !!$$

Donc  $|y_1| \neq |y_2|$ . Quitte à échanger  $y_1$  et  $y_2$  supposons  $|y_1| < |y_2|$ .

$$\forall n \in \mathbb{N}, z_n = y_2^n \left[ \alpha \left( \frac{y_1}{y_2} \right)^n + \beta \right] \text{ et } \left| \frac{y_1}{y_2} \right| = \frac{|y_1|}{|y_2|} < 1. \text{ Par conséquent } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{y_1}{y_2} \right)^n = 0.$$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \alpha \left( \frac{y_1}{y_2} \right)^n + \beta \right) = \beta. \text{ Supposons } \beta \neq 0. \quad z_n \sim \beta y_2^n.$$

$$|z_n| \sim |\beta| |y_2|^n. \text{ Or } |y_1| < |y_2| \text{ donc } |y_1| |y_2|^n < |y_2|^{n+1}, \quad |z_n| < |y_2|^{n+1}.$$

Ainsi  $|z_n| > 1$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} |z_n| = \lim_{n \rightarrow +\infty} (|\beta| |y_2|^n) = +\infty$ . Ceci entraîne la

convergence de la suite  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  (ici  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge,  $(|z_n|)_{n \in \mathbb{N}}$  converge).

$$\text{Donc } \beta = 0. \quad \forall n \in \mathbb{Z}, z_n = \alpha y_1^n. \quad \forall n \in \mathbb{N}, z_n = \alpha y_1^n = \alpha \left( \frac{1}{y_1} \right)^n$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, |z_n| = |\alpha| \left| \frac{1}{y_1} \right|^n. \text{ Or } \left| \frac{1}{y_1} \right|^n = \left| \frac{y_2}{y_1} \right|^n = |y_2| > 1.$$

Si  $|\alpha| \neq 0$   $\lim_{n \rightarrow +\infty} (|\alpha| \left| \frac{1}{y_1} \right|^n) = +\infty$  donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} |z_n| = +\infty$ . Ceci entraîne

la convergence de  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ . Or  $|z_n| = 0$ . Ainsi  $\alpha = 0$ .  $\alpha = \beta = 0$ .

Alors  $(z_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  est la suite nulle.

2<sup>e</sup> cas.  $|A| < 2$ . Alors  $y_1$  et  $y_2$  sont complexes et conjugués... et non réels !

$$\exists \lambda \in \mathbb{R}_+^*, \exists \theta \in ]0, \pi[ \cup ]\pi, 2\pi[ , y_1 = \lambda e^{i\theta} \text{ et } y_2 = \lambda e^{-i\theta}$$

de plus  $y_1 y_2 = 1$ . Alors  $\lambda^2 = 1$  et  $\lambda > 0$  donc  $\lambda = 1$ .  $y_1 = e^{i\theta}$  et  $y_2 = e^{-i\theta}$ .

Soit  $n \in \mathbb{Z}$ .  $x_n \in \mathbb{R}$  et  $x_n = \alpha e^{in\theta} + \beta e^{-in\theta}$ .  $x_n = \operatorname{Re}(x_n) = \operatorname{Re}(e^{in\theta} + \beta e^{-in\theta})$ .

donc  $x_n = \operatorname{Re}(e^{in\theta}) + \operatorname{Re}(\beta e^{-in\theta})$ . Pour  $\alpha = \alpha_1 + i\alpha_2$  et  $\beta = \beta_1 + i\beta_2$  avec  $(\alpha_1, \alpha_2) \in \mathbb{R}^2$  et

$$(\beta_1, \beta_2) \in \mathbb{R}^2. x_n = \operatorname{Re}((\alpha_1 + i\alpha_2)(\cos n\theta + i\sin n\theta) + (\beta_1 + i\beta_2)(\cos n\theta - i\sin n\theta))$$

$$x_n = \alpha_1 \cos n\theta + \beta_1 \cos n\theta - \alpha_2 \sin n\theta + \beta_2 \sin n\theta. \text{ Posons } a = \alpha_1 + \beta_1 \text{ et } b = \beta_2 - \alpha_2.$$

Alors  $x_n = a \cos(n\theta) + b \sin(n\theta)$  et ceci pour tout  $n$  dans  $\mathbb{Z}$ .

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \frac{1}{2}(x_n + x_{-n}) = \frac{1}{2}(a \cos n\theta + b \sin n\theta) + a \cos(n\theta) - b \sin(n\theta) = a \cos(n\theta).$$

Si les suites  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(x_{-n})_{n \in \mathbb{N}}$  convergent donc la suite  $(a \cos(n\theta))_{n \in \mathbb{N}}$  converge.

Supposons  $a \neq 0$ . Alors la suite  $(\cos(n\theta))_{n \in \mathbb{N}}$  converge. Notons  $l$  sa limite.

$\forall n \in \mathbb{N}, \cos(n+1)\theta = \cos(n\theta)\cos\theta - \sin(n\theta)\sin\theta$  et  $\sin\theta \neq 0$  car  $\theta \in ]0, \pi[ \cup ]\pi, 2\pi[$ .

$$\text{Alors } \forall n \in \mathbb{N}, \sin(n\theta) = \frac{1}{\sin\theta} [\cos(n\theta)\cos\theta - \cos(n+1)\theta].$$

Alors la suite  $(\sin(n\theta))_{n \in \mathbb{N}}$  converge comme combinaison linéaire de deux suites convergentes.

Notons  $l'$  sa limite.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \cos^2(n\theta) + \sin^2(n\theta) = 1, \cos^2(n\theta) = \frac{1 + \cos(2n\theta)}{2}, \sin^2(n\theta) = \frac{1 - \cos(2n\theta)}{2} \text{ et } \sin(2n\theta) = 2\sin(n\theta)\cos(n\theta).$$

En faisant tendre  $n$  vers  $+\infty$  il vient :

$$l^2 + l'^2 = 1, l'^2 = \frac{1}{2}(1+l), l'^2 = \frac{1}{2}(1-l) \text{ et } l' = 2ll'.$$

$$0 = 2l^2 - l - 1 = (l-1)(2l+1). \text{ Ainsi } l = 1 \text{ ou } l = -\frac{1}{2}$$

Supposons  $l = 1$ . Alors  $l'^2 = \frac{1}{2}(1-1) = 0$ .  $l' = 0$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sin(n\theta) = \frac{1}{\sin\theta} [\cos(n\theta)\cos\theta - \cos(n+1)\theta]$$

En faisant tendre  $n$  vers  $+\infty$  il vient  $0 = \frac{1}{\sin\theta} [\cos\theta - 1]$ .

Alors  $\cos\theta = 1$ . Ceci est incompatible car  $\theta \in ]0, \pi[ \cup ]\pi, 2\pi[$ .

Supposons  $e = -\frac{1}{2}$ .  $e^1 = 2(-\frac{1}{2})e^1$ ;  $e^2 = -e^1$ ;  $e^3 = 0$ .

$$\text{Ainsi } 1 = e^2 + e^3 = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2} \text{ !}$$

Finalement  $(\cos(u, 0))_{u \in \mathbb{N}}$  ne converge pas ! et donc impossible d'avoir  $a \neq 0$ .

Ainsi  $a = 0$  et  $\forall n \in \mathbb{Z}$ ,  $x_n = b \sin(n\theta)$ .

Supposons  $b \neq 0$ . Comme  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge,  $(\sin(n\theta))_{n \in \mathbb{N}}$  converge.

$\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\sin((n+1)\theta) = \sin n\theta \cos \theta + \cos n\theta \sin \theta$  et  $\sin \theta \neq 0$ .

Ainsi  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\cos(n\theta) = \frac{1}{\sin \theta} (\sin((n+1)\theta) - \sin(n\theta) \cos \theta)$ . Ainsi la suite  $(\cos(n\theta))_{n \in \mathbb{N}}$

converge comme combinaison linéaire de deux suites convergentes. A nous avons vu

que cela est impossible. Ainsi on ne peut pas avoir  $b \neq 0$ . Ainsi  $b = 0$ .

Dans ces conditions  $\forall n \in \mathbb{Z}$ ,  $x_n = 0$ .  $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  est la suite nulle.

Finalement dans les deux cas si  $(u_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  appartient à  $\text{Ker}(T - \lambda \text{Id}_S)$ ,  $(u_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  est la suite nulle. Ceci suffit pour dire que  $\text{Ker}(T - \lambda \text{Id}_S) = \{0\}$ .

Il doit  $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  un élément de  $\text{Ker}(T - 2\text{Id}_S)$ .

$\forall n \in \mathbb{Z}$ ,  $x_{n+1} + x_{n-1} = 2x_n$ .  $\forall n \in \mathbb{Z}$ ,  $x_{n+1} - x_n = x_n - x_{n-1}$ . Alors la suite  $(x_{n+1} - x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  est constante.  $\exists \hat{a} \in \mathbb{R}$ ,  $\forall n \in \mathbb{Z}$ ,  $x_{n+1} - x_n = \hat{a}$  et  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge.

En notant  $L$  sa limite et en faisant tendre  $n$  vers  $+\infty$  dans l'égalité précédente il vient :

$L - L = \hat{a}$ . Donc  $\hat{a} = 0$ . Ainsi  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $x_{n+1} = x_n$ .  $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  est constante.

$\exists \hat{b} \in \mathbb{R}$ ,  $\forall n \in \mathbb{Z}$ ,  $x_n = \hat{b}$ . Pour  $\forall n \in \mathbb{Z}$ ,  $u_n = 1$  et  $u = (u_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ .

On a  $u_n = \hat{b} \cdot u_n = 1$  donc  $u \in S$  et  $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \text{Vect}(u)$ .

$$\forall n \in \mathbb{Z}, x_n = \hat{a} = 0 \cdot u_n.$$

Ainsi  $\text{Ker}(T - 2\text{Id}_S) \subset \text{Vect}(u)$ .

$u \in S$  et  $\forall n \in \mathbb{Z}$ ,  $u_{n+1} + u_{n-1} = 2 = 2u_n$ . Ainsi  $u \in S$  et  $T|u| = 2u$ .

Par conséquent  $u \in \text{Ker}(T - 2\text{Id}_S)$ . Alors  $\text{Vect}(u) \subset \text{Ker}(T - 2\text{Id}_S)$  car  $\text{Ker}(T - 2\text{Id}_S)$  est un sous-espace vectoriel de  $S$ .

Finalement  $\text{Ker}(T - 2\text{Id}_S) = \text{Vect}(u)$  où  $u$  est la suite de 1 est tous les termes sont égaux à 1.

⊂) Soit  $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \text{Ker}(T + 2\text{Id}_S)$ .  $T((x_n)_{n \in \mathbb{Z}}) = -2(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ .

$$\forall n \in \mathbb{Z}, x_{n+1} + x_{n-1} = -2x_n$$

$$\text{En particulier } \forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} + x_n = (-1)(x_n + x_{n-1}).$$

Alors  $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} + x_n = (-1)^n (x_1 + x_0)$ .  $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  d'appartient à  $S$  donc  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge. Alors  $(x_{n+1} + x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge donc  $((-1)^n (x_1 + x_0))_{n \in \mathbb{N}}$  converge.

Si  $x_1 + x_0 \neq 0$  alors on obtient la convergence de  $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$  !!

Ainsi  $x_1 + x_0 = 0$ . Alors  $x_1 = -x_0$  et  $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} + x_n = 0$ .  $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = -x_n$ .

$\forall n \in \mathbb{N}, x_n = (-1)^n x_0$ . La convergence de  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  donne la convergence de  $((-1)^n x_0)_{n \in \mathbb{N}}$  qui implique  $x_0 = 0$  car  $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$  diverge.

$x_0 = 0$  donc  $\forall n \in \mathbb{N}, x_n = (-1)^n x_0 = 0$ . Réciproque pour démontrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, x_{-n} = 0.$$

• C'est vrai pour  $n=0$ . Or pour  $x_{-1} + x_1 = -2x_0$  donc  $x_{-1} = -x_1 - 2x_0 = 0$ . L'égalité est vraie pour  $n=0$  et  $n=1$ .

• Supposons la propriété vraie pour  $n$  et  $n+1$  avec  $n \in \mathbb{N}$ . Alors  $x_{-n} = x_{-n-1} = 0$ .

$x_{-n-2} + x_{-n} = -2x_{-n-1}$ . Donc  $x_{-n-2} = -x_{-n} - 2x_{-n-1} = 0$ . Ceci admette la récurrence.

Finalement  $\forall n \in \mathbb{N}, x_n = 0$  et  $x_{-n} = 0$ . Alors  $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} = 0_S$ .

Ici on a  $\text{Ker}(T + 2\text{Id}_S) = \{0_S\}$ .

cadencia

19 est la seule valeur propre de T.

29 SEP(T, 2) = Vect(u) ou u est la suite constante de 1 égale à 1

**EXERCICE 53****N1** Un marronnier!

$E$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$  non nulle.  $a$  et  $b$  sont deux éléments distincts de  $\mathbb{K}$ .

$f$  est un endomorphisme de  $E$  tel que  $(f - a \text{Id}_E) \circ (f - b \text{Id}_E) = 0_{\mathcal{L}(E)}$ . Montrer que  $f$  est diagonalisable.

Thème abordé dans LYON 1993 MI Pb 1, EDHEC 2006 ex 1, oral ESCP 2005 2.9. Thème implicitement contenu dans ESCP 2006 2.17.

Dans une QSP ESCP 2008 on trouve  $A(A - \alpha I_n) = 0_{M_n(\mathbb{K})}$  avec  $\alpha \neq 0$ ...

•  $(X-a)(X-b)$  est un polynôme annulateur de  $f$  d'at degrés petit  $a$  et  $b$ .  $\text{Sp } f \subset \{a, b\}$ .

• Pour  $F_a = \kappa_a (f - a \text{Id}_E)$  et  $F_b = \kappa_b (f - b \text{Id}_E)$ .

Noter que  $F_a$  et  $F_b$  sont supplémentaires.

Soit  $x \in E$ . Notion par analogie - synthèse qui s'opère un unique couple  $(y, z)$

de  $F_a \times F_b$  tel que  $x = y + z$ .

Analyse  $\rightarrow$  supprimer que  $y \in F_a, z \in F_b$  et  $x = y + z \downarrow$

$$f(x) = f(y + z) = ay + bz, \quad ax = ay + az \quad \text{et} \quad bx = by + bz.$$

$$\text{Avec } f(x) - bx = ay + bz - by - bz = (a-b)y; \quad y = \frac{1}{a-b} (f(x) - bx).$$

$$\cdot f(x) - ax = ay + bz - ay - az = (b-a)z; \quad z = \frac{1}{b-a} (f(x) - ax).$$

ce qui adéresse de noter l'unicité des couples  $(y, z)$ .

Synthèse  $\rightarrow$  pour  $y = \frac{1}{a-b} (f(x) - bx)$  et  $z = \frac{1}{b-a} (f(x) - ax)$ . Notons que  $z = \frac{1}{a-b} (ax - f(x))$ .

$$y + z = \frac{1}{a-b} (f(x) - bx - f(x) + ax) = \frac{1}{a-b} (a-b)x = x; \quad y + z = x.$$

$$(f - a \text{Id}_E)(f - b \text{Id}_E) = 0_{\mathcal{L}(E)}$$

$$(f - a \text{Id}_E)(y) = \frac{1}{a-b} (f - a \text{Id}_E)(f(x) - bx) = \frac{1}{a-b} ((f - a \text{Id}_E) \circ (f - b \text{Id}_E))(x) = 0x = 0x; \quad y \in F_a.$$

Noter que  $(f - b \text{Id}_E) \circ (f - a \text{Id}_E) = f^2 - bf - af + ah \text{Id}_E = (f - b \text{Id}_E) \circ (f - a \text{Id}_E)$ .

Avec  $(f - b \text{Id}_E) \circ (f - a \text{Id}_E) = (f - a \text{Id}_E) \circ (f - b \text{Id}_E) = 0_{\mathcal{L}(E)}$ .  $\rightarrow$

Avec  $(f - b \text{Id}_E)(z) = \frac{1}{b-a} (f - b \text{Id}_E)(f(x) - ax) = \frac{1}{b-a} ((f - b \text{Id}_E) \circ (f - a \text{Id}_E))(x) = 0x = 0x; \quad z \in F_b$ .

Ainsi  $x = y + z$  et  $(y, z) \in F_a \times F_b$ . ce qui adéresse de noter l'unicité

des couples  $(y, z)$ .

$\forall x \in E, \exists ! (y, z) \in F_A \times F_B, x = y + z$ . Ainsi  $E = F_A \oplus F_B$ .

Alors  $E = \ker(f - a \text{Id}_E) \oplus \ker(f - b \text{Id}_E)$ .

Envisageons trois cas.

1<sup>er</sup> cas..  $\ker(f - a \text{Id}_E) = \{0_E\}$ . Alors  $E = \ker(f - b \text{Id}_E)$ .  $f - b \text{Id}_E = 0_{\mathcal{L}(E)}$ .  $f = b \text{Id}_E$ .

Alors  $\text{Sp}_f = \{b\}$  et  $f$  est diagonalisable.

Remarque.. si  $f = b \text{Id}_E$  alors  $\ker(f - b \text{Id}_E) = E$  et réciproquement  $\ker(f - a \text{Id}_E) = \{0_E\}$ .

2<sup>nd</sup> cas..  $\ker(f - b \text{Id}_E) = \{0_E\}$ . Alors  $E = \ker(f - a \text{Id}_E)$ .  $f - a \text{Id}_E = 0_{\mathcal{L}(E)}$ .  $f = a \text{Id}_E$ .

Alors  $\text{Sp}_f = \{a\}$  et  $f$  est diagonalisable.

Remarque.. si  $f = a \text{Id}_E$  alors  $\ker(f - a \text{Id}_E) = E$  et réciproquement  $\ker(f - b \text{Id}_E) = \{0_E\}$ .

3<sup>rd</sup> cas..  $\ker(f - a \text{Id}_E) \neq \{0_E\}$  et  $\ker(f - b \text{Id}_E) \neq \{0_E\}$ . Alors  $a$  et  $b$  sont valeurs propres de  $f$ . Comme  $\text{Sp}_f \subset \{a, b\}$  :  $\text{Sp}_f = \{a, b\}$ .

de plus  $E = \ker(f - a \text{Id}_E) \oplus \ker(f - b \text{Id}_E) = \text{SEP}(f, a) \oplus \text{SEP}(f, b)$ .

donc  $f$  est diagonalisable.

Conclusion. 1<sup>o</sup>  $f$  est toujours diagonalisable

2<sup>o</sup> si  $f = a \text{Id}_E$ ,  $\text{Sp}_f = \{a\}$

3<sup>o</sup> si  $f = b \text{Id}_E$ ,  $\text{Sp}_f = \{b\}$

4<sup>o</sup> si  $f \neq a \text{Id}_E$  et  $f \neq b \text{Id}_E$  alors  $\text{Sp}_f = \{a, b\}$ .



EXERCICE 54 $n \in \mathbb{N}^*$ 

Exercice

$$f \circ g - g \circ f = g$$

 $E$  est un espace vectoriel de dimension  $n$  sur  $\mathbb{K}$ .  $f$  et  $g$  sont deux endomorphismes de  $E$  tel que :  $f \circ g - g \circ f = g$ .Q1. Montrer que pour tout  $k$  dans  $\mathbb{N}$  :  $f \circ g^k - g^k \circ f = k g^k$ .Q2. Pour tout  $u$  dans  $\mathcal{L}(E)$  on pose :  $\varphi(u) = f \circ u - u \circ f$ .a) Montrer que  $\varphi$  est un endomorphisme de  $\mathcal{L}(E)$ .b) Montrer, en raisonnant par l'absurde, que  $g$  est nilpotent (c'est à dire qu'il existe  $r$  dans  $\mathbb{N}$  tel que  $g^r = 0_{\mathcal{L}(E)}$ ).

Q1) Par récurrence que :  $\forall k \in \mathbb{N}, f \circ g^k - g^k \circ f = k g^k$ .

c'est d'abord pour  $k=0$  car  $g^0 = \text{id}_E$ . Supposons la propriété vraie pour un élément  $k$  de  $\mathbb{N}$  et montrons la pour  $k+1$ .

$$f \circ g^k - g^k \circ f = k g^k \text{ d'ac } g \circ f \circ g^k - g^{k+1} \circ f = k g^{k+1} \text{ et } g \circ f = f \circ g - g.$$

$$\text{Avec } k g^{k+1} = (f \circ g - g) \circ g^k - g^{k+1} \circ f = f \circ g^{k+1} - g^{k+1} \circ f - g^{k+1} \circ f.$$

$$\text{Ainsi } f \circ g^{k+1} - g^{k+1} \circ f = k g^{k+1} + g^{k+1} = (k+1) g^{k+1}. \text{ Ceci est la récurrence.}$$

$$\underline{\underline{\forall k \in \mathbb{N}, f \circ g^k - g^k \circ f = k g^k.}}$$

Q2)  $\forall u \in \mathcal{L}(E)$ ,  $f \circ u \in \mathcal{L}(E)$  et  $u \circ f \in \mathcal{L}(E)$  car  $u \in \mathcal{L}(E)$

d'ac  $\forall u \in \mathcal{L}(E)$ ,  $\varphi(u) = f \circ u - u \circ f \in \mathcal{L}(E)$ . Par une application à  $\mathcal{L}(E)$  dans  $\mathcal{L}(E)$ .

Soit  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Soit  $(u, v) \in \mathcal{L}(E) \times \mathcal{L}(E)$ .

$$\varphi(\lambda u + v) = f \circ (\lambda u + v) - (\lambda u + v) \circ f = \lambda f \circ u + f \circ v - \lambda u \circ f - v \circ f$$

$$\varphi(\lambda u + v) = \lambda (f \circ u - u \circ f) + f \circ v - v \circ f = \lambda \varphi(u) + \varphi(v). \underline{\underline{\varphi \text{ est linéaire.}}}$$

Ainsi  $\varphi$  est un endomorphisme de  $E$ .

b) Supposons que  $g$  ne soit pas nilpotent.  $\forall k \in \mathbb{N}^*, g^k \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$ .

d'après Q1 :  $\forall k \in \mathbb{N}^*, f \circ g^k - g^k \circ f = k g^k$ .

Alors  $\forall k \in \mathbb{N}^*, g^k \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$  et  $\varphi(g^k) = k g^k$ . Ainsi  $\forall k \in \mathbb{N}^*, \exists \lambda \in S, \varphi$ .

d'ac  $\varphi$  admet une infinité de valeurs propres or  $\varphi$  est un endomorphisme de  $\mathcal{L}(E)$  qui est de dimension finie égale à  $n^2$ . Ceci est donc contradictoire.

Ainsi  $\exists r \in \mathbb{N}^*, g^r = 0_{\mathcal{L}(E)}$ .  $g$  est nilpotent.

## EXERCICE 55

N1

Une QSP classique.

$A$  est une matrice diagonalisable de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle qu'il existe un élément  $p$  de  $\mathbb{N}^*$  vérifiant :  $A^p = I_n$ . Montrer que  $A^2 = I_n$ .

$A$  est diagonalisable donc il existe une matrice inversible  $P$  de  $\mathbb{R}^n$  et une matrice diagonale  $D$  de  $\mathbb{R}^n$  telles que  $P^{-1}AP = D$ .

$\exists (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$  tel que  $D = \text{Diag}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ .

$$D^p = (P^{-1}AP)^p = P^{-1}A^pP = P^{-1}I_nP = I_n.$$

de plus  $D^p = \text{Diag}(\alpha_1^p, \alpha_2^p, \dots, \alpha_n^p)$ . Alors  $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$ ,  $\alpha_k^p = 1$ .

avec  $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$ ,  $\alpha_k = 1$  ou  $-1$ .  $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$ ,  $\alpha_k^2 = 1$ .

dans ces conditions  $D^2 = (\text{Diag}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n))^2 = \text{Diag}(\alpha_1^2, \alpha_2^2, \dots, \alpha_n^2) = \text{Diag}(1, 1, \dots, 1) = I_n$ .

$$P^{-1}AP = D \text{ donc } A = PDP^{-1}. \text{ Alors } A^2 = (PDP^{-1})^2 = PD^2P^{-1} = PI_nP^{-1} = I_n.$$

$$\text{donc } \underline{\underline{A^2 = I_n}}.$$

Pour que... on trouve souvent et parfois avec  $A$  symétrique à la place de  $A$  diagonalisable...

**EXERCICE 56**    **N1**    QSP ESCP 2007, QSP HEC 2009

$f$  est un endomorphisme d'un espace vectoriel  $E$  de dimension  $n$  sur  $\mathbb{K}$ . Montrer que si  $\text{Ker } f$  et  $\text{Im } f$  ne sont pas supplémentaires alors  $f$  n'est pas diagonalisable.

Il suffit de montrer que si  $f$  est diagonalisable alors  $\text{Ker } f$  et  $\text{Im } f$  sont supplémentaires.

**V1** Supposons que  $f$  est diagonalisable et montrons que  $E = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f$ .

C'est donc si  $\text{Ker } f = \{0_E\}$  (donc  $\text{Im } f = E$ ) et si  $\text{Ker } f = E$  (donc  $\text{Im } f = \{0_E\}$ ).

Supposons  $\text{Ker } f \neq \{0_E\}$  et  $\text{Ker } f \neq E$ .

Alors 0 est valeur propre de  $E$  et  $\text{SEP}(f, 0) = \text{Ker } f$ . Comme  $f$  est diagonalisable et

que  $\text{SEP}(f, 0) \neq E$ ,  $f$  possède au moins une valeur propre non nulle. Notons

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$  les valeurs propres non nulles de  $f$ .

$$E = \text{SEP}(f, 0) \oplus \text{SEP}(f, \lambda_1) \oplus \dots \oplus \text{SEP}(f, \lambda_p).$$

$$E = \text{SEP}(f, 0) \oplus F \quad \text{où } F = \bigoplus_{i=1}^p \text{SEP}(f, \lambda_i).$$

Notons que  $\dim E = \dim \text{SEP}(f, 0) + \dim F = \dim \text{Ker } f + \dim F$ .  $\dim F = \dim E - \dim \text{Ker } f = \dim \text{Im } f$ .

Soit  $i \in \{1, \dots, p\}$  et  $z \in \text{SEP}(f, \lambda_i)$ .  $f(z) = \lambda_i z$ .  $z = \frac{1}{\lambda_i} f(z) = f\left(\frac{1}{\lambda_i} z\right) \in \text{Im } f$ .

Alors pour tout  $i \in \{1, \dots, p\}$ ,  $\text{SEP}(f, \lambda_i) \subset \text{Im } f$ . Alors  $F = \bigoplus \text{SEP}(f, \lambda_i) \subset \text{Im } f$  car

$\text{Im } f$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

donc  $\dim F = \dim \text{Im } f$  et  $F \subset \text{Im } f$ . Ainsi  $F = \text{Im } f$ . Alors  $\text{Ker } f \oplus F = E$  donc

$$E = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f.$$

**V2** Supposons  $f$  diagonalisable et montrons que  $E = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f$ .

Le théorème du rang donne  $\dim E = \dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f$ .

Comme  $E$  est de dimension finie il existe plus qu'à un matrice que  $\text{Ker } f \cap \text{Im } f = \{0_E\}$ .

$f$  est diagonalisable donc il existe une base  $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$  de  $E$  constituée de

vecteurs propres de  $f$  respectivement associés aux valeurs propres  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ .

Soit  $x \in \text{Ker } f \cap \text{Im } f$ .  $f(x) = 0_E$  et  $\exists t \in E, f(t) = x$ .

$$\exists (t_1, t_2, \dots, t_n) \in \mathbb{K}^n, t = \sum_{i=1}^n t_i e_i$$

$$\text{Avec } x = f\left(\sum_{i=1}^n t_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n t_i f(e_i) = \sum_{i=1}^n t_i d_i e_i \quad x = \sum_{i=1}^n t_i d_i e_i$$

$$0_E = f(0_E) = f\left(\sum_{i=1}^n t_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n t_i d_i f(e_i) = \sum_{i=1}^n t_i d_i^2 e_i$$

La abelité de  $(e_1, e_2, \dots, e_n)$  donne :  $\forall i \in \{1, n\}, t_i d_i^2 = 0$ .

Ainsi  $\forall i \in \{1, n\}, t_i = 0$  ou  $d_i^2 = 0$ .

$\forall i \in \{1, n\}, t_i = 0$  ou  $d_i = 0$ .

$\forall i \in \{1, n\}, t_i d_i = 0$ .

Ainsi  $x = \sum_{i=1}^n t_i d_i e_i = 0_E$ . C'est ce qui fallait démontrer.

On retrouve ainsi la nullité de  $K_{f \circ \text{Inf}}$ .

Si  $f$  est diagonalisable sur  $K_{f \circ \text{Inf}}$  et  $\text{Inf}$  est nilpotente.

Exercice. Montrer que la réciproque est fautive.

Si  $K_{f \circ \text{Inf}}$  ne peut pas être nilpotente alors  $f$  n'est pas diagonalisable.

**EXERCICE 57** NI+ Une QSP HEC 2011

$n \in \mathbb{Z}, +\infty[$ . Soient  $x$  et  $y$  deux réels et  $F$  l'endomorphisme de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  définie par :  $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), F(M) = xM + y^t M$ .

Q1. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que  $F$  soit un projecteur.

Q2. Donner les valeurs propres de  $F$ .

Q3.  $F$  est-il diagonalisable ?

Dans une QSP ESCP 2011 on trouve Q2 et Q3 avec  $x = y = 1$ .

Q1) Soit  $\Pi \in E$ . donc tout ce qui suit  $E = \Pi_n(\mathbb{R})$ .

$$F(F(\Pi)) = x F(\Pi + y^t \Pi) = x(x \Pi + y^t \Pi) + y^t(x \Pi + y^t \Pi)$$

$$F'(\Pi) = x^2 \Pi + x y^t \Pi + y(x^t \Pi + y^t \Pi) = x^2 \Pi + x y^t \Pi + y x^t \Pi + y^2 \Pi$$

$$\underline{\underline{F^2(\Pi) = (x^2 + y^2) \Pi + 2xy^t \Pi}}$$

\* Supposons que  $F$  est un projecteur.

$$\text{Alors } F^2 = F. \forall \Pi \in E, F^2(\Pi) = \Pi. \forall \Pi \in E, (x^2 + y^2) \Pi + 2xy^t \Pi = x \Pi + y^t \Pi$$

En particulier  $(x^2 + y^2) I_n + 2xy^t I_n = x I_n + y^t I_n. (x^2 + y^2) I_n + 2xy I_n = x I_n + y^t I_n$ .

$$\text{Comme } I_n \neq 0 \in \quad x^2 + y^2 + 2xy = x + y; \quad (x+y)^2 = x + y$$

Soit  $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$  la base canonique de  $\Pi_n(\mathbb{R})$ . Pour  $A = E_{3,2} - E_{2,1}$ .

$$A \neq 0 \in \quad \text{Or } tA = -A. \text{ de plus } (x^2 + y^2) A + 2xy^t A = x A + y^t A$$

$$\text{donc } (x^2 + y^2) A - 2xy A = x A - y A \text{ et } A \neq 0 \in$$

$$\text{Ainsi } x^2 + y^2 - 2xy = x - y; \quad (x-y)^2 = x - y$$

$$\text{Finalement } \begin{cases} (x+y)^2 = (x+y) \\ (x-y)^2 = (x-y) \end{cases} \bullet \begin{cases} y = -x \text{ ou } y = 1-x \\ y = x \text{ ou } y = x-1 \end{cases}$$

1<sup>er</sup> Cas..  $y = -x$

$$\text{Alors } -x = x \text{ ou } -x = x-1; \quad x=0 \text{ ou } x = \frac{1}{2}. \text{ Alors } (x, y) = (0, 0) \text{ ou } (x, y) = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$$

2<sup>er</sup> Cas..  $y = 1-x$

$$\text{Alors } 1-x = x \text{ ou } 1-x = x-1; \quad x = \frac{1}{2} \text{ ou } x = 1. \text{ Alors } (x, y) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \text{ ou } (x, y) = (1, 0)$$

Finalement  $\Pi$  est un projecteur :  $(x, y) \in \{(0, 0), (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (1, 0)\}$ .

Notions laéciproque. Rappeler que  $F$  est un endomorphisme de  $E$ .

1<sup>er</sup> Cas...  $(x, y) = (0, 0)$ .  $F = 0_{\mathcal{L}(E)}$  donc  $F \circ F = F$  et  $F$  est un projecteur.

2<sup>er</sup> Cas...  $(x, y) = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ .

$$\forall n \in E, F(n) = \frac{1}{2}n - \frac{1}{2}{}^t n \text{ et } F'(n) = (\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2 \text{ et } \frac{1}{2}n - \frac{1}{2}{}^t n = \frac{1}{2}n - \frac{1}{2}{}^t n = F(n).$$

$F \circ F = F$ .  $F$  est un projecteur.

3<sup>er</sup> Cas...  $(x, y) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ .

$$\forall n \in E, F(n) = \frac{1}{2}n + \frac{1}{2}{}^t n \text{ et } F'(n) = ((\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2) \text{ et } \frac{1}{2}n + \frac{1}{2}{}^t n = F(n).$$

$F \circ F = F$ .  $F$  est un projecteur.

4<sup>er</sup> Cas...  $(x, y) = (1, 0)$ .  $F = Id$  donc  $F \circ F = F$ .  $F$  est un projecteur.

Fonction  $F$  est un projecteur si et seulement si  $(x, y) \in \{(0, 0), (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (1, 0)\}$ .

Q2 Soit  $n \in E$ .  $F'(n) = (x^2 + y^2)n + 2xy{}^t n = (x^2 + y^2 - 2xy^2)n + 2x^2n + 2xy^2n$ .

$$F^2(n) = (y^2 - x^2)n + 2x(xn + y{}^t n) = (y^2 - x^2)n + 2x F(n).$$

Alors  $(F^2 - 2x F + (x^2 - y^2) Id_E)(n) = 0_E$  et ceci pour tout  $n$  dans  $E$ .

$$\text{donc } (F^2 - 2x F + (x^2 - y^2) Id_E) = 0_{\mathcal{L}(E)}.$$

$x^2 - 2xyx + x^2 - y^2$  est un polynôme annulateur de  $F$ .

$$x^2 - 2xyx + x^2 - y^2 = (x - y)(x - x + y).$$

donc pour de  $x^2 - 2xyx + x^2 - y^2$  on a  $x + y \neq x - y$ .

donc  $\text{Sp } F \subset \{x + y, x - y\}$ .

Si  $y = 0 \forall n \in E, F(n) = xn$ ;  $F = x Id_E$ .  $\text{Sp } F = \{x\}$  et  $\text{SEP}(F, x) = E$ .

Supposons  $y \neq 0$ . Alors  $x + y \neq x - y$ . Soit  $n \in E$ .

$$n \in \text{Ker}(F - (x + y) Id_E) \Leftrightarrow F(n) = (x + y)n \Leftrightarrow xn + y{}^t n = xn + yn \Leftrightarrow y{}^t n = yn \Leftrightarrow \begin{matrix} y \neq 0 \\ \downarrow \end{matrix} n = n.$$

$$n \in \text{Ker}(F - (x - y) Id_E) \Leftrightarrow F(n) = (x - y)n \Leftrightarrow xn + y{}^t n = xn - yn \Leftrightarrow y{}^t n = -yn \Leftrightarrow \begin{matrix} y \neq 0 \\ \downarrow \end{matrix} n = -n.$$

Alors  $\text{Ker}(F - (x + y) Id_E) = \{n \in E \mid n = n\}$  et  $\text{Ker}(F - (x - y) Id_E) = \{n \in E \mid n = -n\}$ .

$\exists x = I_n$  et  $I_n \neq 0_E$  donc  $\text{Ker}(F - (x+y)Id_E) \neq \{0_E\}$ . Alors  $x$  est valeur propre de  $F$   
 $\exists (E_{1,2} - E_{2,1}) = - (E_{1,2} - E_{2,1})$  et  $E_{1,2} - E_{2,1} \neq 0_E$  donc  $\text{Ker}(F - (x-y)Id_E) \neq \{0_E\}$  alors  $x-y$   
 est valeur propre de  $F$ .

Conclusion. // Si  $y = 0$  :  $\text{Sp } F = \{x\}$

// Si  $y \neq 0$  :  $\text{Sp } F = \{x+y, x-y\}$

Notons que dans les deux cas  $\text{Sp } F = \{x+y, x-y\}$  !

Q3) 1<sup>er</sup> cas.  $y = 0$ .

$F = x Id_E$ .  $\text{Sp } F = \{x\}$  et  $\text{SEP}(F, x) = E$ .  $F$  est diagonalisable.

2<sup>er</sup> cas.  $y \neq 0$   $\text{Sp } F = \{x+y, x-y\}$ ,  $\text{SEP}(F, x+y) = \lambda \pi \in E$  |  $\eta = \pi$  et et

$$\text{SEP}(F, x-y) = \lambda \pi \in E \text{ | } \eta = -\pi.$$

Pour  $E_1 = \text{SEP}(F, x+y)$  et  $E_2 = \text{SEP}(F, x-y)$ . Notons que les deux sous-espaces vectoriels  $E_1$  et  $E_2$  de  $E$  sont supplémentaires.

• Soit  $\pi \in E_1 \cap E_2$ .  $\forall \pi = \pi \neq \pi = -\pi$ .  $\pi = 0_E$ . Ainsi  $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$ .  
 • Soit  $\pi \in E$ .

$$\pi = S + A \text{ avec } S = \frac{1}{2}(n + \pi) \text{ et } A = \frac{1}{2}(n - \pi).$$

$$\text{d'où } \forall S = \frac{1}{2}(\pi + \pi) = \frac{1}{2}(\pi + \pi) = S \text{ et}$$

$$\forall A = \frac{1}{2}(\pi - \pi) = \frac{1}{2}(\pi - \pi) = -A.$$

Alors  $\pi = S + A$  avec  $S \in E_1$  et  $A \in E_2$ .  $\pi \in E_1 + E_2$  et ceci pour tout  $\pi \in E$ .

donc  $E \subset E_1 + E_2$ . Or  $E_1 + E_2 \subset E$ . Ainsi  $E = E_1 + E_2$ .

$$\text{Finalement } E = E_1 \oplus E_2.$$

donc  $\text{Sp } \pi = \{x+y, x-y\}$  et  $E = \text{SEP}(F, x+y) \oplus \text{SEP}(F, x-y)$ .  $F$  est diagonalisable.

Pour conclure  $F$  est toujours diagonalisable.

Exercice On munit  $E = \pi_1(\mathbb{R})$  du produit scalaire canonique que l'on note  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ . Noter que  $F$  est un endomorphisme symétrique.

$$\text{Remarques} \dots \forall (n, m) \in E^2, \langle n, m \rangle = \text{tr}(\pi n m).$$

**EXERCICE 58** **PC**  
LYON 1989 MI Pb 1 Partie A

Endomorphisme égal à la somme de deux projecteurs qui commutent.

$p$  et  $q$  sont deux projecteurs du  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  tels que :  $p \circ q = q \circ p$ ,  $f = p + q$ .

Q0 Justifier les inclusions  $\text{Sp } p \subset \{0, 1\}$  et  $\text{Sp } q \subset \{0, 1\}$

Q1. Soit  $\lambda$  une valeur propre de  $f$  et  $x$  un vecteur propre associé.

a) Montrer que  $p(q(x)) = q(p(x)) = (\lambda - 1)p(x) = (\lambda - 1)q(x)$  (1).

b) En utilisant Q0 et (1) montrer que  $\lambda \in \{0, 1, 2\}$ .

Q2. Montrer que 0 est valeur propre de  $f$  si et seulement si :  $\text{Ker } p \cap \text{Ker } q \neq \{0_E\}$  (un sens clair ; pour l'autre Q0+(1)).

Q3. Montrer que 2 est valeur propre de  $f$  si et seulement si :  $\text{Im } p \cap \text{Im } q \neq \{0_E\}$  (again).

Q4. Ils ont oublié 1, toi pas, hein ?

On retrouve ce thème dans ESCP 2007 2.10.

Q0  $p^2 = p$  (resp.  $q^2 = q$ ). Alors  $\lambda^2 - \lambda$  est un polynôme annulateur de  $p$  et de  $q$  donc les valeurs propres sont 0 et 1. Alors  $\text{Sp } p \subset \{0, 1\}$  et  $\text{Sp } q \subset \{0, 1\}$ .

Q1  $\lambda \in \{1\}$  et  $x$  est un vecteur propre associé. Soit  $x \neq 0_E$  et  $f(x) = \lambda x$ .

$$a) f(x) = \lambda x \text{ donc } p(x) + q(x) = \lambda x.$$

$$\cdot p(p(x) + q(x)) = p(\lambda x) = \lambda p(x); \quad p^2(x) + p(q(x)) = \lambda p(x).$$

$$\text{Comme } p^2 = p : p(q(x)) = \lambda p(x) - p^2(x) = \lambda p(x) - p(x) = (\lambda - 1)p(x).$$

$$\cdot q(p(x) + q(x)) = q(\lambda x) = \lambda q(x); \quad p(q(x)) + q^2(x) = \lambda q(x).$$

$$\text{Alors } p(q(x)) = \lambda q(x) - q^2(x) = \lambda q(x) - q(x) = (\lambda - 1)q(x) \text{ car } q^2 = q.$$

Rappelons que  $p \circ q = q \circ p$  par hypothèse.

$$\text{Ainsi } \underline{p(q(x)) = q(p(x)) = (\lambda - 1)p(x) = (\lambda - 1)q(x)}. \quad (1)$$

b) Supposons  $q(x) \neq 0_E$ . Comme  $p(q(x)) = (\lambda - 1)q(x) : \lambda - 1 \in \text{Sp } p$ .

Soit  $\lambda - 1 \in \{0, 1\}$ . Alors  $\lambda = 1$  ou  $\lambda = 2$ .

Supposons  $q(x) = 0_E$ . Alors  $p(x) = p(x) + q(x) = f(x) = \lambda x \forall x \neq 0_E$ .  $\lambda \in \text{Sp } p$ .

Soit  $\lambda \in \{0, 1\}$ . Alors  $\lambda = 0$  ou  $\lambda = 1$ .

Finalement  $\lambda \in \{0, 1, 2\}$ .



Q2 \* Supposons que  $K \cap I \cap \kappa \neq \emptyset$ .

Alors  $\exists x_0 \in K \cap I \cap \kappa \neq \emptyset$  et  $x_0 \neq 0_E$ .  $f(x_0) = p(x_0) + q(x_0) = 0_E = 0 \times x_0$ .

Donc 0 est valeur propre de  $f$ .

\* Supposons que  $f$  est valeur propre de  $f$ .  $\exists x \in E$ ,  $f(x) = 0 \cdot x$  et  $x \neq 0_E$ .

(1) avec  $\lambda = 0$  donne en particulier  $(0-1)p(x) = (0-1)q(x)$  donc  $p(x) = q(x)$ .

$0_E = 0 \cdot x = f(x) = p(x) + q(x) = 2p(x)$ ;  $p(x) = 0_E$ . Par symétrie  $p(x) = q(x) = 0_E$ .

Alors  $x \neq 0_E$  et  $x \in K \cap I \cap \kappa \neq \emptyset$ .

0 est valeur propre de  $f$  si et seulement si  $K \cap I \cap \kappa \neq \emptyset$ .

Q3 \* Supposons que  $I \cap J \cap \kappa \neq \emptyset$ .

Alors  $\exists x_2 \in I \cap J \cap \kappa \neq \emptyset$  et  $x_2 \neq 0_E$ .  $p$  et  $q$  ont deux propriétés dans

$I \cap J = K \setminus (K \setminus I \setminus J)$  et  $I \cap J = K \setminus (K \setminus I \setminus J)$ .  $p(x_2) = x_2$  et  $q(x_2) = x_2$ .

Ainsi  $f(x_2) = p(x_2) + q(x_2) = 2x_2 \neq 0_E$ .  $\lambda$  est valeur propre de  $f$ .

\* Supposons que  $\lambda$  est valeur propre de  $f$ .  $\exists x \in E$ ,  $f(x) = \lambda x$  et  $x \neq 0_E$ .

(1) donne en particulier  $(\lambda-1)p(x) = (\lambda-1)q(x)$ ;  $p(x) = q(x)$ .

Alors  $\lambda x = f(x) = p(x) + q(x) = 2p(x)$ ;  $p(x) = x$ . Donc  $p(x) = x$  et  $q(x) = x$ .

Ainsi  $x \in K \setminus (K \setminus I \setminus J) \cap K \setminus (K \setminus I \setminus J)$ ;  $x \in I \cap J \cap \kappa \neq \emptyset$ .

Donc  $I \cap J \cap \kappa \neq \emptyset$ .

$\lambda$  est valeur propre de  $f$  si et seulement si  $I \cap J \cap \kappa \neq \emptyset$ .

Q4 J'ai répondu n'est par donnée. Commencez par une analyse.

\* Supposons que  $\lambda$  est valeur propre de  $f$ .  $\exists x \in E$ ,  $f(x) = \lambda x$  et  $x \neq 0_E$ .

Alors  $p(x) + q(x) = \lambda x$  et (1) donne en particulier  $p(x) = q(x) = \frac{\lambda x}{2}$ .

1<sup>er</sup> cas..  $q(u) \neq 0_E$ .  $q(u) \in \text{Im } q$  et  $p(q(u)) = 0_E$ .

Alors  $q(u) \neq 0_E$  et  $q(u) \in \text{Ker } p \cap \text{Im } q$ ;  $\text{Ker } p \cap \text{Im } q \neq \{0_E\}$ .

2<sup>er</sup> cas..  $q(u) = 0_E$ . Alors  $u \in \text{Ker } q$  et  $p(u) = p(v) + q(u) = v$ .  
 $\stackrel{!}{f(u)} = x$ .

$x \in \text{Ker } q \cap \text{Ker}(p - \text{Id}_E) = \text{Im } p$ .

Ainsi  $x \neq 0_E$  et  $x \in \text{Ker } q \cap \text{Im } p$ .  $\text{Ker } q \cap \text{Im } p = \{0_E\}$ .

Si  $\exists$  est valeur propre de  $f$ :  $\text{Ker } p \cap \text{Im } q \neq \{0_E\}$  ou  $\text{Ker } q \cap \text{Im } p \neq \{0_E\}$ .

\* Réciproquement supposons que  $\text{Ker } p \cap \text{Im } q \neq \{0_E\}$  ou  $\text{Ker } q \cap \text{Im } p \neq \{0_E\}$ .

. supposons  $\text{Ker } p \cap \text{Im } q \neq \{0_E\}$ .  $\exists x_1 \in \text{Ker } p \cap \text{Im } q$  et  $x_1 \neq 0_E$ .

Alors  $x_1 \in \text{Ker } p \cap \text{Ker}(q - \text{Id}_E)$ .  $p(x_1) = 0_E$  et  $q(x_1) = x_1$ .

Alors  $x_1 \neq 0_E$  et  $f(x_1) = p(x_1) + q(x_1) = 0_E + x_1 = x_1$ .  $\exists$  est valeur propre de  $f$ .

. Inversement de même que si  $\text{Ker } q \cap \text{Im } p \neq \{0_E\}$ .  $\exists$  est valeur propre de  $f$ .

Finalement  $\exists$  est valeur propre de  $f$  si et seulement si  $(\text{Ker } p \cap \text{Im } q) \cup (\text{Ker } q \cap \text{Im } p) \neq \{0_E\}$

EXERCICE 59

N2

Transvection ou presque... QSP ESCP 2007

$E$  est un espace vectoriel sur  $\mathbb{K}$  de dimension  $n$  ( $n \geq 2$ ).  $\varphi$  est une forme linéaire sur  $E$  et  $a$  est un élément de  $E$ .

On considère l'application  $f$  définie sur  $E$  par :  $\forall x \in E, f(x) = x + \varphi(x)a$ .

Q1. Montrer que  $f$  est un endomorphisme de  $E$ .

Q2. Trouver les valeurs propres et les sous-espaces propres de  $f$ .  $f$  est-il diagonalisable ?

Thème abordé dans ESCP 2007 2.17.

Q1) Soit  $x \in E$ .  $\varphi(x) \in \mathbb{K}$  donc  $x + \varphi(x)a$  appartient à  $E$  comme combinaison linéaire de deux éléments de  $E$ . Alors  $f$  est l.e.

$\forall x \in E, f(x) \in E$ .  $f$  est une application de  $E$  dans  $E$ .

• Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Soit  $(x, y) \in E^2$ .

$$f(\lambda x + y) = \lambda x + y + \varphi(\lambda x + y)a = \lambda(x + y) + (\lambda\varphi(x) + \varphi(y))a = \lambda(x + \varphi(x)a) + y + \varphi(y)a.$$

$$f(\lambda x + y) = \lambda f(x) + f(y).$$

$\forall (x, y) \in E^2, f(\lambda x + y) = \lambda f(x) + f(y)$ .  $f$  est linéaire.

Ainsi  $f$  est un endomorphisme de  $E$ .

Q2) 1<sup>er</sup> cas...  $a = 0_E$  ou  $\varphi = 0_{\mathcal{L}(E, \mathbb{K})}$ . Alors  $f = \text{Id}_E$ . donc  $\text{Sp} f = \{1\}$  et  $\text{SEP}(f, \lambda) = E$ .

2<sup>ème</sup> cas...  $a \neq 0_E$  et  $\varphi \neq 0_{\mathcal{L}(E, \mathbb{K})}$ .

Remarque...  $\exists n, \varphi \subset \mathbb{K}$  et  $\exists n, \varphi \neq 1_{0_E}$ . Alors  $\exists \leq \dim \exists n, \varphi \leq \dim \mathbb{K} = 1$ .

donc  $\exists n, \varphi \subset \mathbb{K}$  et donc  $\exists n, \varphi = 1$ .  $\exists n, \varphi = \mathbb{K}$ .

donc  $\text{Ker} \varphi = \dim E - \dim \exists n, \varphi$ ; donc  $\text{Ker} \varphi = n-1$ .  $\text{Ker} \varphi$  est un hyperplan de  $E \dots$  ce qui n'est pas un scopp.

Alors  $\forall x \in E, f(x) = x \Leftrightarrow \varphi(x)a = 0_E \Leftrightarrow \varphi(x) = 0_{\mathbb{K}} \Leftrightarrow x \in \text{Ker} \varphi$ .  $\text{Ker}(f - \text{Id}_E) = \text{Ker} \varphi$ .

$a \neq 0_E$

et donc  $\text{Ker} \varphi = n-1 \geq 1$ . donc  $\text{Ker} \varphi \neq 1_{0_E}$ . Alors  $\text{Ker}(f - \text{Id}_E) \neq 1_{0_E}$ .

donc  $\exists \text{SEP} f$  et  $\text{SEP}(f, \lambda) = \text{Ker} \varphi$ .

Soit  $\lambda \in \mathbb{K} - \{1\}$ . Soit  $x \in E$ .

$$x \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E) \Leftrightarrow f(x) = \lambda x \Leftrightarrow x + \varphi(x)a = \lambda x \Leftrightarrow \varphi(x)a = (\lambda - 1)x$$

$$x \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E) \Leftrightarrow x = \frac{\varphi(x)}{\lambda - 1} a$$

$$x \in \text{Ker}(\lambda \cdot \text{Id}_E) \Leftrightarrow x = \frac{\varphi(x)}{\lambda-1} a \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\varphi(x)}{\lambda-1} a \\ \varphi(x) = \varphi\left(\frac{\varphi(x)}{\lambda-1} a\right) = \frac{\varphi(x)}{\lambda-1} \varphi(a) \end{cases}$$

équivalence à valider

$$x \in \text{Ker}(\lambda \cdot \text{Id}_E) \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\varphi(x)}{\lambda-1} a \\ \varphi(x) [\lambda \cdot \text{Id}_E] = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \lambda \cdot \text{Id}_E \cdot \varphi(x) \neq 0$$

$$x \in \text{Ker}(\lambda \cdot \text{Id}_E) \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi(x) = 0 \\ x = \frac{0}{\lambda-1} a = 0_E \end{cases} \Leftrightarrow x = 0_E. \text{ Alors } \lambda \neq 1 \text{ et pas valeur propre.}$$

$$\Leftrightarrow \lambda \cdot \text{Id}_E \cdot \varphi(x) = 0 ; \lambda = 1 + \varphi(x)$$

Remarque... Nous sommes dans ce cas ou  $\lambda \neq 1$ . Ainsi  $\lambda \cdot \text{Id}_E - \varphi(x) = 0$  suppose

que  $\varphi(x) \neq 0$ , c'est à dire que  $a \notin \text{Ker} \varphi$ .

$$x \in \text{Ker}(\lambda \cdot \text{Id}_E) \Leftrightarrow x = \frac{\varphi(x)}{\lambda-1} a \Rightarrow x \in \text{Vect}(a). \text{ Donc } \text{Ker}(\lambda \cdot \text{Id}_E) \subset \text{Vect}(a).$$

Le  $\lambda$  qui convient doit  $\exists \in \text{Vect}(a)$ .  $\exists \beta \in \mathbb{R}, \exists \delta a$ .

$$(\lambda \cdot \text{Id}_E)(\beta a) = \beta(\lambda-1) a = \beta(\lambda-1) a - (\lambda+1)\varphi(a) \beta = \varphi(\beta a) a - \varphi(a) \beta = \varphi(\beta a) a - \varphi(a) \beta a.$$

$$(\lambda \cdot \text{Id}_E)(\beta a) = \beta \varphi(a) a - \varphi(a) \beta a = 0_E \cdot \beta \in \text{Ker}(\lambda \cdot \text{Id}_E).$$

Ainsi  $\text{Ker}(\lambda \cdot \text{Id}_E) = \text{Vect}(a)$  et  $\text{Vect}(a) \neq \{0_E\}$  car  $a \neq 0_E$ .

Alors  $\lambda$  est valeur propre de  $\varphi$  et  $\text{Vect}(\beta a) = \text{Vect}(a)$ ... lorsque  $\lambda = 1 + \varphi(a)$  et  $\varphi(a) \neq 0$ .

Conclusion le  $\lambda$  conv...  $a \neq 0_E$  et  $\varphi \neq \mathcal{O}_{\mathcal{L}(E, K)}$ .

Si  $a \in \text{Ker} \varphi$  :  $\text{Sp} \varphi = \{1\}$  et  $\text{Vect}(\beta a) = \text{Vect}(0_E) = \{0_E\}$ .

Si  $a \notin \text{Ker} \varphi$  :  $\text{Sp} \varphi = \{1, 1 + \varphi(a)\}$ ,  $\text{Vect}(\beta a) = \text{Vect}(\beta a) \neq \text{Vect}(0_E) = \text{Vect}(a)$ .

Remarque... Notons que si  $a \notin \text{Ker} \varphi$ ,  $\varphi(a) \neq 0_K$  donc  $a \neq 0_E$  et  $\varphi \neq \mathcal{O}_{\mathcal{L}(E, K)}$ .

Conclusion. - Si  $a \notin \text{Ker } \varphi : \text{Sp } \varphi = \{1, 1 + \varphi(0)\}, \text{SEP}(\varphi, \mathcal{J}) = \text{Ker } \varphi$  et  $\text{SEP}(\varphi, \mathcal{J} + \varphi(0)) = \text{Vect}(a)$

Si  $a \in \text{Ker } \varphi : \text{Sp } \varphi = \{1\}$  et  $\text{SEP}(\varphi, \mathcal{J}) = \begin{cases} \text{Ker } \varphi & \text{si } a \neq 0_E \\ E & \text{si } a = 0_E \end{cases}$

• Supposons que  $a \notin \text{Ker } \varphi$ . Comme nous l'avons dit  $\varphi \neq 0_{\mathcal{L}(E, K)}$  et  $a \neq 0_E$ .

Alors  $\varphi \text{ Sp } \varphi = \{1, 1 + \varphi(0)\}$

et  $\varphi \text{ SEP}(\varphi, \mathcal{J}) + \text{Vect}(\text{SEP}(\varphi, \mathcal{J} + \varphi(0))) = \text{dim Ker } \varphi + \text{dim Vect}(a) = n - 1 + 1 = n = \text{dim } E$

Alors  $\varphi$  est diagonalisable.

• Supposons que  $a \in \text{Ker } \varphi$ . Alors  $\text{Sp } \varphi = \{1\}$ .

Si  $a = 0_E : \text{SEP}(\varphi, \mathcal{J}) = E$ .  $\varphi$  est diagonalisable

si  $a \neq 0_E$ .  $\text{SEP}(\varphi, \mathcal{J}) = \text{Ker } \varphi$ .  $\varphi$  est diagonalisable si et seulement

si  $\text{Ker } \varphi = E$  c'est-à-dire si et seulement si  $\varphi = 0_{\mathcal{L}(E, K)}$ .

Remarque. - Notons que si  $a = 0_E$  ou si  $\varphi = 0_{\mathcal{L}(E, K)} : a \in \text{Ker } \varphi$ .

Finalement :

$\varphi$  est diagonalisable si et seulement si :  $a \notin \text{Ker } \varphi$  ou  $a = 0_E$  ou  $\varphi = 0_{\mathcal{L}(E, K)}$ .

## C'EST RIEN QUE POUR TOI C. H.

**Exercice** ESCP 98  $E$  est un espace vectoriel sur  $\mathbb{C}$  de dimension  $n$  ( $n \in \llbracket 2, +\infty \rrbracket$ ). Un endomorphisme  $f$  de  $E$  est dit cyclique si l'on peut trouver  $x_0$  élément de  $E$  tel que  $(x_0, f(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$  soit une base de  $E$ .

Q1. Dans cette question on suppose que  $f$  est un endomorphisme de  $E$  tel que  $f^n = 0_{\mathcal{L}(E)}$  et  $f^{n-1} \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$ .

Montrer que  $f$  est cyclique. Préciser son noyau et son image.  $f$  est-il diagonalisable ?

Q2.  $f$  est un endomorphisme cyclique de  $E$  et  $x_0$  est un élément de  $E$  tel que  $\mathcal{B} = (x_0, f(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$  soit une base de  $E$ .  $\mathcal{C} = \{g \in \mathcal{L}(E) \mid f \circ g = g \circ f\}$ .

a) Soit  $g$  un élément de  $\mathcal{C}$ . En écrivant  $g(x_0)$  dans la base  $\mathcal{B}$ , montrer qu'il existe un élément  $P$  de  $\mathbb{C}_n[X]$  tel que  $g = P(f)$ .

b) Achever la détermination de  $\mathcal{C}$ .

Q3.  $f$  est un endomorphisme cyclique de  $E$  et  $x_0$  est un élément de  $E$  tel que  $\mathcal{B} = (x_0, f(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$  soit une base de  $E$ . On suppose que  $f^n(x_0) = x_0$ .

a) Montrer que  $f^n = Id_E$ .

b) Trouver les valeurs propres et les sous-espaces propres de  $f$ .

**Q1** doit  $x_0 \in E$  tel que  $\int (x_0) \neq 0_E$ . ( $\int \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$ ). Notons que

$\mathcal{B} = (x_0, f(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$  est une base de  $E$

cord  $\mathcal{B} = n \text{ dim } E$ , il suffit de c de noter que la famille est l'êve.

Soit  $(\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$  tel que  $\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i f^i(x_0) = 0_E$ .

Notons par récurrence que  $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \alpha_k = 0$

•  $0_E = \int (0_E) = \int \left( \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i f^i(x_0) \right) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i f^{i+1}(x_0)$ .  $\forall k \in \llbracket n, +\infty \rrbracket, \int^k = 0_{\mathcal{L}(E)}$ .

Alors  $0_E = \alpha_0 f(x_0) + \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i f^{i+1}(x_0) = \alpha_0 f(x_0)$  et  $f(x_0) \neq 0$ .

Ainsi  $\alpha_0 = 0$ .

• Supposons la propriété vraie jusqu'à  $k$  et  $\alpha_k \neq 0$ .  $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ .  $\alpha_0 = \alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$ .

Alors  $0_E = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i f^i(x_0) = \sum_{i=k+1}^{n-1} \alpha_i f^i(x_0)$ .

Ainsi  $\int^{n-1-(k+1)} \left( \sum_{i=k+1}^{n-1} \alpha_i f^i(x_0) \right) = \int^{n-1-(k+1)} (0_E) = 0_E$  ( $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ ) d'ac

$n-1-(k+1) \geq 0$ .  $n \geq k+2$  :  $n-1-(k+1) \geq 2$ .

Alors  $0_E = \sum_{i=k+1}^{n-1} \alpha_i f^i(x_0) = \alpha_{k+1} f^{k+1}(x_0)$  et  $f^{k+1}(x_0) \neq 0_E$ .

Ainsi  $\alpha_{i+1} = 0$  ce qui adèse la récurrence. On adèse <sup>aussi</sup> de même que  $B = (\alpha_0, \beta_0, \dots, f^{(n)}(\alpha_0))$  est une base de  $E$ .

Alors il existe un élément  $x_0 \in E$  tel que  $(\alpha_0, \beta_0, \dots, f^{(n)}(\alpha_0))$  soit une base de  $E$  donc jet ay chaque.

$f(\alpha_0, \dots, f^{(n)}(\alpha_0))$  est une famille d'élément de  $\mathbb{K} \setminus \mathbb{F}$ . C'est aussi une sous-famille d'une famille libre. Alors  $(f(\alpha_0), \dots, f^{(n)}(\alpha_0))$  est une famille libre de  $\mathbb{K} \setminus \mathbb{F}$ .

Ainsi dim  $\mathbb{K} \setminus \mathbb{F} \geq n-1$ .

$f^{(n)}(\alpha_0) \neq 0$  et  $f(f^{(n)}(\alpha_0)) = f^{(n+1)}(\alpha_0) = 0$ .  $f^{(n)}(\alpha_0)$  est un élément non nul de  $\mathbb{K} \setminus \mathbb{F}$ .

Ainsi dim  $\mathbb{K} \setminus \mathbb{F} \geq 2$ .

On a dim  $\mathbb{K} \setminus \mathbb{F} + \dim \mathbb{K} \setminus \mathbb{F} = n$  donc dim  $\mathbb{K} \setminus \mathbb{F} = 1$  et dim  $\mathbb{K} \setminus \mathbb{F} = n-1$ .

$\mathbb{K} \setminus \mathbb{F}$  est une droite vectorielle de  $E$  et  $f^{(n)}(\alpha_0)$  est un élément non nul de  $\mathbb{K} \setminus \mathbb{F}$ .

$(f^{(n)}(\alpha_0))$  est une base de  $\mathbb{K} \setminus \mathbb{F}$ .

$(f(\alpha_0), \dots, f^{(n)}(\alpha_0))$  est une famille libre de  $\mathbb{K} \setminus \mathbb{F}$  de cardinal  $n-1$ . Comme dim  $\mathbb{K} \setminus \mathbb{F} = n-1$  :

$(f(\alpha_0), \dots, f^{(n)}(\alpha_0))$  est une base de  $\mathbb{K} \setminus \mathbb{F}$ .

$X^n$  est un polynôme annulateur de  $f$  admettant un zéro et un réel : 0.

Alors  $\text{Sp } f \subset \{0\}$ . Pour  $\alpha \in \mathbb{K} \setminus \mathbb{F} \neq 0 \in \text{Sp } f$ .

Ainsi  $\text{Sp } f = \{0\}$  et dim  $\text{Ker}(f - 0I) = \dim \mathbb{K} \setminus \mathbb{F} = 1 < n = \dim E$ .

Donc  $f$  n'est pas diagonalisable.

(92) a) soit  $g \in \mathbb{C}$ .  $g(\alpha_0)$  appartient à  $E$  donc

$$\exists ! (\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}) \in \mathbb{C}^n, \quad g(\alpha_0) = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k f^{(k)}(\alpha_0).$$

Prenons  $h = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k f^k$  et montrons que  $g = h$ .  $g$  est la pol. de Taylor de  $h$  en  $v_0$ .  
 de  $E$  et  $\mathcal{B} = (v_0, f(v_0), \dots, f^{n-1}(v_0))$  est une base de  $E$ .

Pour montrer que  $g = h$  il suffit de montrer que  $\forall v \in \mathbb{R}^n, h(v) = g(f(v))$ .  
 $g \circ f = f \circ g$ ; alors une récurrence simple donne  $\forall i \in \mathbb{N}, g \circ f^i = f^i \circ g$ .

$$\forall i \in \mathbb{R}^n, h(v) = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k f^k(v) = f^i \left( \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k f^{k-i}(v) \right) = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k f^{k-i}(v) = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_{k+i} f^k(v).$$

$$\forall i \in \mathbb{R}^n, h(v) = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k f^k(v) = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_{k+i} f^k(v) = h(f^i(v)).$$

Ceci a chère de montrer que  $g = h = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k f^k$ .

Prenons  $P = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k X^k$ .  $P \in \mathcal{C}_{n-1}[X]$  et  $g = P(f)$ .

$\forall g \in \mathcal{C}, \exists P \in \mathcal{C}_{n-1}[X], g = P(f)$ .

Équivalentement soit  $P \in \mathcal{C}_{n-1}[X]$ . Posons  $g = P(f)$ . Posons aussi  $Q = X$ .

$$g \circ f = P(f) \circ Q(f) = (P \circ Q)(f) = (g \circ P)(f) = g \circ P = f \circ g; g \in \mathcal{C}.$$

Finalement  $\mathcal{C} = \{P(f); P \in \mathcal{C}_{n-1}[X]\}$ .

Pourquoi... Ceci signifie à dire que  $\mathcal{C} = \text{Vect}(S_{\mathcal{C}}, f, \dots, f^{n-1})$ .

Exercice... Montrer que  $(S_{\mathcal{C}}, f, \dots, f^{n-1})$  est une base de  $\mathcal{C}$ .

(Q3) a)  $f^n$  et  $S_{\mathcal{C}}$  sont des polynômes de  $E$  et  $\mathcal{B} = (v_0, f(v_0), \dots, f^{n-1}(v_0))$  est une base de  $E$ . Pour montrer que  $f^n = S_{\mathcal{C}}$  il suffit de montrer que  $f^n$  et  $S_{\mathcal{C}}$  coïncident sur les éléments de  $\mathcal{B}$ .

$$\forall i \in \mathbb{R}^n, f^n(f^i(v_0)) = f^n(f^i(v_0)) = f^i(f^n(v_0)).$$

Ainsi:  $f^n = S_{\mathcal{C}}$ .



b) Noter que  $X^n$  est une polynôme caractéristique de  $f$ .

Alors  $\text{Sp}(f) \subset \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\} = \{e^{i \frac{2\pi k}{n}} \mid k \in \{0, \dots, n-1\}\}$ .

Soit  $\lambda \in \{0, \dots, n-1\}$ . Posons  $\lambda = e^{i \frac{2\pi \lambda}{n}}$ . Soit  $u$  un vecteur  $u$  de  $E$  correspondant à  $(t_0, t_1, \dots, t_{n-1})$  dans  $\mathbb{B} = (u_0, f(u_0), \dots, f^{n-1}(u_0))$ .

$u \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)$

①  $f(u) = \lambda u$

②  $\text{NB } f \begin{pmatrix} t_0 \\ t_1 \\ \vdots \\ t_{n-1} \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} t_0 \\ t_1 \\ \vdots \\ t_{n-1} \end{pmatrix}$

③  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_0 \\ t_1 \\ \vdots \\ t_{n-1} \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} t_0 \\ t_1 \\ \vdots \\ t_{n-1} \end{pmatrix}$

④  $\begin{cases} t_{n-1} = \lambda t_0 \\ t_0 = \lambda t_1 \\ \vdots \\ t_{n-2} = \lambda t_{n-1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t_{n-1} = \lambda t_0 \\ t_{n-2} = \lambda t_{n-1} \\ t_{n-3} = \lambda t_{n-2} \\ \vdots \\ t_1 = \lambda^{n-2} t_{n-1} \\ t_0 = \lambda^{n-1} t_{n-1} \end{cases}$

$\begin{cases} t_{n-1} = \lambda t_0 \\ t_{n-2} = \lambda t_{n-1} \\ t_{n-3} = \lambda t_{n-2} \\ \vdots \\ t_1 = \lambda^{n-2} t_{n-1} \\ t_0 = \lambda^{n-1} t_{n-1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t_{n-1} = \lambda^n t_{n-1} \\ t_{n-2} = \lambda t_{n-1} \\ t_{n-3} = \lambda^2 t_{n-1} \\ \vdots \\ t_1 = \lambda^{n-2} t_{n-1} \\ t_0 = \lambda^{n-1} t_{n-1} \end{cases}$

Or  $\lambda^n = 1$  et  $u \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E) \Leftrightarrow \begin{cases} t_0 = \lambda^{n-1} t_{n-1} \\ t_1 = \lambda^{n-2} t_{n-1} \\ \vdots \\ t_{n-2} = \lambda t_{n-1} \end{cases}$

$(u_0, f(u_0), \dots, f^{n-1}(u_0))$  est une base

Ainsi  $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E) = \text{Vect}(\lambda^{n-1} x_0 + \lambda^{n-2} f(x_0) + \dots + \lambda f^{n-2}(x_0) + f^{n-1}(x_0)) \neq \{0\} = \lambda \text{Id}_E$ .

Ainsi  $\text{Sp}(f) = \{e^{i \frac{2\pi k}{n}} \mid k \in \{0, \dots, n-1\}\}$ .

$\forall \lambda \in \text{Sp}(f), \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E) = \text{Vect}(\lambda^{n-1} x_0 + \lambda^{n-2} f(x_0) + \dots + \lambda f^{n-2}(x_0) + f^{n-1}(x_0))$ .

Noter que  $f$  a  $n$  valeurs propres distinctes et que  $\dim E = n$ . Ainsi  $f$  est diagonalisable.